第5回がん市民公開講座

胃がん手術患者の看護

～手術から退院までの関わり～

独立行政法人 国立病院機構 岡山医療センター
消化器外科・内科病棟看護師 細川 樹理

-
1. 入院されてから手術までの関わり
  2. 手術後の関わり
  3. 食事の食べ方
  4. 退院後の生活を考えた指導

胃がんと告知されて

- どのように病気を受け止めていますか？

「手術して病気を治したい！」

「手術しないといけないから、、、」

「先生に全てお任せします」

病気と向かい合う気持ちを持つ

患者さんを知る

■ 患者さんの話を傾聴する

- ・患者さんが何を知りたいのか
- ・病気、治療のことをどこまで理解しているのか

手術はどのくらい時間がかかるのか？
他にも同じ病気の人がいるのか？
手術してもご飯が食べられるのか？

手術に向けて

- 疑問の解決・不安の軽減

医師からの説明

入院診療計画書説明
“退院までの流れの説明”

術前オリエンテーション
“手術の準備を整える”

入院診療計画書

《入院診療計画書》						
		患者氏名			様	
		主治医:				
		1. 予定入院期間..... 21日間				
		2. 現在考えられる疾患.....				
		3. 病状.....				
		4. 入院目的..... 手術				
		5. 治療計画..... 胃全摘出術予定				
		6. 看護計画の有無..... あり・なし			注1: 病名等は現時点で考えられるもので、今後検査等を 注2: 入院期間については現時点で予定されるものです。	
年 月 日	入院日・手術前日	手術当日(手術前)	手術当日(術後)	手術翌日～4日目	5日目～7日目	8日目
診療目標	- 術前の準備ができ手術を迎えることができる。 - 術前の検査を終えることができる。 - 手術の内容・術後の状況に関して理解できてる。	予定通り手術ができる。	- 術後合併症を起こさず全身状態が安定している。 38.0度以上の発熱がなく過ごせる。 - 創部痛があるときは、痛み止めを使用され、緩和できる。	- 術後合併症を起こさず全身状態が安定している。 38.0度以上の発熱がなく過ごせる。 - 創部痛があるときは、痛み止めを使用され、緩和できる。 - 早期に体を動かすことの必要性が理解でき歩行できる。 - 術後2日目までには尿管が抜けトイレまで歩行できる。	- 水分摂取ができる。 - 重湯を食べることができる。 - 病棟内を歩けるようになる。	- 食事が開始できる。 - 食事をしても膨れない。 - お腹の管が抜ける。
食事	手術前日までお食事はありますが、病院食以外のものは食べないようにしてください。	食べた量飲んだりしないでお待ちください。	食べた量飲んだりできません。	食べた量飲んだりできません。	5日目から水分は摂れるようになります。看護師がお伝えするまではお待ちください。 6日目からはお食事が重湯から始まります。	- 毎日食事が変わります。 - お食事ははじからお食事の食べ明があります。
活動	特に制限はありません。	トイレ、洗面以外はベッド上で過ごし下さい。	手術後はベッド上で過ごしください。ベッドの上で体の向きを変えることはできません。	- 手術翌日から状態が落ち着いていけば、体を動かしていきます。最初に歩くときは看護師が付き添います。 - できる範囲で歩きましょう。	病棟内を歩けます。	活動の制限はほとんど動きません。
清潔	- 入浴、シャワー浴ができます。 - 手術前日は除毛後に入浴してください。	入浴・シャワー浴はできません。		看護師が体を拭いたりシャンプーをします。		お腹の管が抜け(シャワー浴がで頃)
処置	- 手術の前日に除毛、臍の処置をします。 - 手術前日に、麻酔科医の診察があります。	朝、浣腸を行います。 - 手術衣に着替えていただきます。 - 血栓予防のソックスをはいていただきます。 - 鼻から管を入れます。	- 手術後は鼻の管、尿管、おなかの管、背中に痛み止めの管が入っています。 - 心電図モニター、血圧計を付けさせていただきます。 - 血栓予防のマッサージ器を足に付けさせていただきます。	- 手術翌日には心電図モニター、血圧計ははずれます。歩行ができれば、足のマッサージ器もはずします。 - 手術翌日～2日目頃には尿管が抜けます。 - 状態を見て2～3日目には鼻の管が抜けます。	- 調子がよければお腹の管を順次抜いていきます。 6日目頃より点滴は昼間だけにします。	10日目までは毎です。
	外来で行っていない検査があれば胃全摘術(入院診療計画書)				レントゲンや採血などがあります。	

手術に向けて

- 疑問の解決・不安の軽減

医師からの説明

入院診療計画書説明
“退院までの流れの説明”

術前オリエンテーション
“手術の準備を整える”

説明はどうでした？

アレはどうなるんだろう？
よく分からなかったなあ...
もう一度聞きたいけど...

いいですよ

手術に向けて

- 疑問の解決・不安の軽減

医師からの説明

入院診療計画書説明
“退院までの流れの説明”

術前オリエンテーション
“手術の準備を整える”

不安、心配...

不安と疑問の解決・改善
患者さまに寄り添う看護

患者さんに起こる変化

■ 生活環境の変化

自宅から病院に変わる
他患者さんとの療養生活が始まる

■ 日常生活動作の変化

検査や手術後は、自分でできていたことが難しくなる
あくまでも『一時的』に起こる変化

生活の質を落とさない為に

早期離床に向けた援助

早期離床とは、ベッドから早く離れること

- 手術後は早めに動く

安静にしなくて大丈夫なの？

少しずつ体を動かしましょう

早く体を動かすことの必要性

- 早く手術前のからだに戻る
- 腸の動きが活発になる
- 体の回復が早くなる

体を早く動かすことは
良いことがいっぱい！

食事が始まります

- 手術後3～5日目には食事が始まる
- 食事が始まって患者さんが思うこと

全部食べても大丈夫？
縫ったところから漏れない？
どんなものなら食べてもいい？

食事は少しずつ変わります

- ・胃の消化機能に負担をかけない食べ物
- ・手術後には手術後の食べ方

小分けに食べる

ゆっくり食べる

食事のときに気をつけることは？

- ダンピング症状(冷や汗、動悸、めまい、全身倦怠感など)

食べたものが一気に腸へと流れこむことで起こる症状

- 分割食
  - 食後の姿勢(食後15分間位座った姿勢で)
-
- 食後のつかえ感、嘔吐
  - 食べるときによく噛むことを意識して
  - 休息をとりながら食べることを意識して
  - 食事をやわらかいものに変えてみる

手術後の胃はこうなっています

【幽門胃切除の場合】

残った胃と十二指腸の断端部を直接つなく

ビルロート1法

十二指腸の断端部を閉じて、残った胃と空腸をつなく

ビルロート2法

十二指腸の断端部を閉じて、残胃と空腸をつなく。その上で、十二指腸の下部を空腸の側壁とつなく

ルーワイ法

退院に向けての指導

- 食事の内容・食べ方
- 排便コントロール

退院後は患者さんが自分で
管理していくことが大切！
入院中に練習して、退院後
に困らないようにしましょう

私たちが大切にしている看護

- 患者さんの理解者になる
- 安全・安楽に過ごせる
- 退院後の生活を考えた支援
- 生活の質を落とさない