

院内採用医薬品リスト

岡山医療センター 薬剤部

2021年 5月版

本リストは正式名称の五十音順で載せています。

*: 規格等が複数ある品目。(規格には注意しましょう)。

用事: 必要時購入する品目。

製剤: 製剤請求する品目。

規制

麻: 麻 薬

向1: 第一種向精神薬

向2: 第二種向精神薬

向3: 第三種向精神薬

毒: 毒 薬

劇: 劇 薬

覚原: 覚醒剤原料

特生: 特定生物由来製品

追加薬剤においては、薬剤委員会資料およびMdviewを参照してください。

- 付録:
- 採用抗菌薬一覧表(系統別)
 - 配合変化を起こしやすい主な酸性注射液とアルカリ性注射薬
 - 混合時に注意すべき注射薬
 - 院内特殊製剤一覧表(保存法、有効期限など)

| 複数規格 | 備考 | 規制 | 医薬品名 | 規格単位 |
|------|----|----|---------------------------|-----------------|
| | | | 「純生」ミョウバン | 10g |
| | | | 0.025W/V%デアミトール水 | 0.025%10mL |
| | | | 0.05W/V%マスキ水 | 0.05%10mL |
| | | 劇 | 1%ディプリバン注-キット | 500mg50mL1筒 |
| | | | 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 10%10g |
| | | | 10%デヒドロコール酸注「ニッシン」 | 10%10mL1管 |
| | | | 20%マンニトール注射液「YD」 | 20%300mL1瓶 |
| | | | 25mgアリナミンF糖衣錠 | 25mg1錠 |
| | | | 5%ヒビテン液 | 5%10mL |
| * | | 劇 | 5-FU注1000mg | 1,000mg1瓶 |
| * | | 劇 | 5-FU注250mg | 250mg1瓶 |
| | | 向3 | 5mgセルシン錠 | 5mg1錠 |
| | | | 70%イソプロピルアルコール*(丸石) | 70%10mL |
| | | | AZ含嗽用配合細粒「NP」 | 0.1%1g |
| | | | AZ点眼液0.02% | 0.02%5mL1瓶 |
| | | | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武 | 6mg1錠 |
| | | | D-ソルビトール経口液75%「コーワ」 | 75%10mL |
| | | | HCGモチダ筋注用5千単位 | 5,000単位1管 |
| * | | | KCL注20mEqキット「テルモ」 | 1モル20mL1キット |
| * | | | KCL補正液キット20mEq | 0.4モル50mL1キット |
| | | | LH-RH注0.1mg「タナベ」 | 0.1mg1管 |
| * | | 麻劇 | MSコンチン錠10mg | 10mg1錠 |
| * | | 麻劇 | MSコンチン錠30mg | 30mg1錠 |
| | | | MS温シップ「タイハウ」 | 10g |
| | | | PA・ヨード点眼・洗眼液 | 0.2%1mL |
| | | 劇 | PL配合顆粒 | 1g |
| | | | SPトローチ0.25mg「明治」 | 0.25mg1錠 |
| | 要時 | | TRH注0.5mg「タナベ」 | 0.5mg1管 |
| | | | アーチスト錠10mg | 10mg1錠 |
| | | | アートセラブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 | 500mL1キット |
| | | 劇 | アービタックス注射液100mg | 100mg20mL1瓶 |
| | 製剤 | 劇 | アイオピジンUD点眼液1% | 1%0.1mL1個 |
| | | 劇 | アイリニア硝子体内注射液40mg/mL | 2mg0.05mL1瓶 |
| | | | アカルボースOD錠100mg「テバ」 | 100mg1錠 |
| | | | アキネトン錠1mg | 1mg1錠 |
| | 要時 | 劇 | アクテムラ点滴静注用200mg | 200mg10mL1瓶 |
| | | | アクトシン軟膏3% | 3%1g |
| | | | アクトス錠30 | 30mg1錠 |
| * | | 毒 | アクプラ静注用100mg | 100mg1瓶 |
| * | | 毒 | アクプラ静注用10mg | 10mg1瓶 |
| | | 劇 | アクラシノン注射用20mg | 20mg1瓶 |
| | | | アコアラン静注用600 | 600国際単位1瓶(溶解液付) |
| | | | アコファイド錠100mg | 100mg1錠 |
| | | | アザクタム注射用1g | 1g1瓶 |
| | | | アザルフィジンEN錠500mg | 500mg1錠 |
| | | | アシアロシンチ注 | 10MBq |
| | | | アシクロビル錠200mg「トーワ」 | 200mg1錠 |
| | | | アシクロビル点滴静注用250mg「トーワ」 | 250mg1瓶 |
| | 要時 | | アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」 | 100mg1g |
| | | | アジルバ錠20mg | 20mg1錠 |
| | | | アストミン錠10mg | 10mg1錠 |
| | | | アズノールST錠口腔用5mg | 5mg1錠 |
| | | | アズノール軟膏0.033% | 0.033%10g |
| | | | アスパラカリウム錠300mg | 300mg1錠 |
| | | | アスピリン「ホエイ」 | 10g |
| | | | アスプールの液(0.5%) | 0.5%1mL |
| | | | アスベリンシロップ0.5% | 0.5%10mL |
| | | | アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」 | 17.6%1mL |
| | | 劇 | アセリオ静注液1000mgバッグ | 1,000mg100mL1袋 |
| | | | アゼルニジピン錠16mg「トーワ」 | 16mg1錠 |
| | | | アゾセミド錠60mg「JG」 | 60mg1錠 |
| | | | アタラックス-Pカプセル25mg | 25mg1カプセル |

| 複数規格 | 備考 | 規制 | 医薬品名 | 規格単位 |
|------|----|----|-------------------------|---------------------|
| | | | アタラックス-Pシロップ0.5% | 0.5%1mL |
| | | | アタラックス-P注射液(25mg/ml) | 2.5%1mL1管 |
| | 要時 | | アディノベイト静注用キット3000 | 3,000国際単位1キット(溶解液付) |
| | | | アデスタン錠300mg | 300mg1個 |
| | 要時 | | アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」 | 60mg20mL1筒 |
| | | | アテノロール錠25mg「日新」 | 25mg1錠 |
| | | | アデホスコーワ顆粒10% | 10%1g |
| * | | 劇 | アデムパス錠0.5mg | 0.5mg1錠 |
| * | | 劇 | アデムパス錠1.0mg | 1mg1錠 |
| * | | 劇 | アデムパス錠2.5mg | 2.5mg1錠 |
| | | | アドシルカ錠20mg | 20mg1錠 |
| | | | アドステロール-I131注射液 | 1MBq |
| | | 劇 | アドセトリス点滴静注用50mg | 50mg1瓶 |
| | | | アドソルビン原末 | 10g |
| | | | アドナ散10% | 10%1g |
| * | 要時 | | アトニン-O注1単位 | 1単位1管 |
| * | | | アトニン-O注5単位 | 5単位1管 |
| | | | アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」 | 10mg1錠 |
| | | 劇 | アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 | 0.1%1mL1筒 |
| | | 劇 | アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」 | 0.05%1mL1筒 |
| | | 劇 | アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」 | 0.05%1mL1管 |
| | | 劇 | アナフラニール点滴静注液25mg | 25mg1管 |
| * | | 劇 | アナペイン注2mg/mL | 0.2%100mL1袋 |
| * | | 劇 | アナペイン注7.5mg/mL | 0.75%10mL1管 |
| | | | アネメトロ点滴静注液500mg | 500mg100mL1瓶 |
| | | | アノーロエリプタ30吸入用 | 30吸入1キット |
| * | | 劇 | アバスチン点滴静注用100mg/4mL | 100mg4mL1瓶 |
| * | | 劇 | アバスチン点滴静注用400mg/16mL | 400mg16mL1瓶 |
| | | | アバプロ錠100mg | 100mg1錠 |
| | | 劇 | アビドラ注ソロスター | 300単位1キット |
| | | 劇 | アフィニール錠5mg | 5mg1錠 |
| * | | 麻劇 | アブストラル舌下錠100μg | 100μg1錠 |
| * | | 麻劇 | アブストラル舌下錠200μg | 200μg1錠 |
| | | | アフタッチ口腔用貼付剤25μg | 25μg1錠 |
| | 特生 | 毒 | アブラキサン点滴静注用100mg | 100mg1瓶 |
| | | 劇 | アブリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」 | 10mg1カプセル |
| | 要時 | 劇 | アベロックス錠400mg | 400mg1錠 |
| | | 劇 | アポカイン皮下注30mg | 30mg3mL1筒 |
| | | 劇 | アボネックス筋注用シリンジ30μg | 30μg0.5mL1筒 |
| | | | アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」 | 50mg1錠 |
| | | 劇 | アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 | 150mg3mL1管 |
| | | 毒 | アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 | 50mg1錠 |
| * | | | アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」 | 100mg1管 |
| * | | | アミカシン硫酸塩注射液200mg「サワイ」 | 200mg1管 |
| | | | アミサリン注100mg | 10%1mL1管 |
| | | | アミティーザカプセル24μg | 24μg1カプセル |
| | | | アミノレバンEN配合散 | 10g |
| | | | アミパレン輸液 | 200mL1袋 |
| | | 毒 | アムビゾーム点滴静注用50mg | 50mg1瓶 |
| * | | 劇 | アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」 | 2.5mg1錠 |
| * | | 劇 | アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 | 5mg1錠 |
| | 要時 | 劇 | アモキシサンカプセル25mg | 25mg1カプセル |
| | | | アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」 | 250mg1カプセル |
| | | | アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 | 3mg6g1キット |
| * | | | アリクストラ皮下注1.5mg | 1.5mg0.3mL1筒 |
| * | | | アリクストラ皮下注2.5mg | 2.5mg0.5mL1筒 |
| * | | | アリクストラ皮下注5mg | 5mg0.4mL1筒 |
| * | | | アリクストラ皮下注7.5mg | 7.5mg0.6mL1筒 |
| * | 要時 | 劇 | アリセプトD錠3mg | 3mg1錠 |
| * | | 劇 | アリセプトD錠5mg | 5mg1錠 |
| | | | アリナミンF100注 | 100mg20mL1管 |
| | | | アリナミン注射液10mg | 10mg1管 |

| 複数規格 | 備考 | 規制 | 医薬品名 | 規格単位 |
|------|----|----|----------------------------|---------------------------|
| | 要時 | 劇 | アリミデックス錠1mg | 1mg1錠 |
| * | | 劇 | アリムタ注射用100mg | 100mg1瓶 |
| * | | 劇 | アリムタ注射用500mg | 500mg1瓶 |
| | | | アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 | 10mg20mL1管 |
| | | | アルギU点滴静注20g | 10%200mL1袋 |
| | | | アルギU配合顆粒 | 1g |
| | | | アルギニン点滴静注30g「AY」 | 10%300mL1袋 |
| | | 毒 | アルケラン錠2mg | 2mg1錠 |
| | | 毒 | アルケラン静注用50mg | 50mg1瓶(溶解液付) |
| | | | アルスロマチック関節手術用灌流液 | 3L1袋 |
| | | | アルダクトンA細粒10% | 10%1g |
| | | 麻劇 | アルチバ静注用2mg | 2mg1瓶 |
| | | | アルドメット錠250 | 250mg1錠 |
| | | 劇 | アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」 | 0.25μg1カプセル |
| | | 劇 | アルファロール内用液0.5μg/mL | 0.5μg1mL |
| | | 劇 | アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「AF」 | 20μg1瓶 |
| | | 劇 | アルプロスタジル注10μg「武田テバ」 | 10μg2mL1管 |
| | | | アルロイドG内用液5% | 10mL |
| | 要時 | 劇 | アレセンサカプセル150mg | 150mg1カプセル |
| | | 劇 | アレビアチン散10% | 10%1g |
| | | | アレビアチン錠100mg | 100mg1錠 |
| | | 劇 | アレビアチン注250mg | 5%5mL1管 |
| | | 劇 | アレンドロン酸錠35mg「トーワ」 | 35mg1錠 |
| | | 劇 | アロキシ静注0.75mg | 0.75mg5mL1瓶 |
| | | | アロチノール塩酸塩錠10mg「日医工」 | 10mg1錠 |
| | | | アロプリノール錠100mg「杏林」 | 100mg1錠 |
| | 製剤 | | アロンアルファA「三共」 | 0.5g1管 |
| | | | アンサー皮下注20μg | 20μg1mL1管(D-アラビノース換算量として) |
| | | 劇 | アンチレクス静注10mg | 1%1mL1管 |
| | | 劇 | アンテベートローション0.05% | 0.05%1g |
| * | | | アンヒバ坐剤小児用100mg | 100mg1個 |
| * | | | アンヒバ坐剤小児用200mg | 200mg1個 |
| | | 麻劇 | アンペック坐剤10mg | 10mg1個 |
| | | | イーケブラ錠500mg | 500mg1錠 |
| | | | イーケブラ点滴静注500mg | 500mg5mL1瓶 |
| | | | イオパミドール300注シリンジ50mL「HK」 | 61.24%50mL1筒 |
| | | | イオフェタミン(123I)注射液「第一」 | 10MBq |
| * | | | イグザレルト錠10mg | 10mg1錠 |
| * | | | イグザレルト錠15mg | 15mg1錠 |
| | 要時 | 劇 | イクスタンジ錠40mg | 40mg1錠 |
| | | | イスコチン錠100mg | 100mg1錠 |
| | | | イソコナゾール硝酸塩錠100mg「F」 | 100mg1個 |
| | | | イソジンシュガーパスタ軟膏 | 1g |
| | | 劇 | イソゾール注射用0.5g | 500mg1瓶(溶解液付) |
| | | | イソバイドシロップ70%分包30mL | 70%30mL1包 |
| | | 毒 | イダマイシン静注用5mg | 5mg1瓶 |
| | | | イトラコナゾールカプセル50mg「SW」 | 50mg1カプセル |
| | | | イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」 | 1%1mL |
| | 要時 | | イナビル吸入粉末剤20mg | 20mg1キット |
| | | | イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」 | 20mg1錠 |
| * | | 劇 | イブランス錠125mg | 125mg1錠 |
| * | | 劇 | イブランス錠25mg | 25mg1錠 |
| | | | イベニティ皮下注105mgシリンジ | 105mg1.17mL1筒 |
| | | | イミダプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 5mg1錠 |
| * | 要時 | 劇 | イミフィンジ点滴静注120mg | 120mg2.4mL1瓶 |
| * | 要時 | 劇 | イミフィンジ点滴静注500mg | 500mg10mL1瓶 |
| | | 劇 | イムノブラダー勝注用80mg | 80mg1瓶(溶解液付) |
| | | | イムラン錠50mg | 50mg1錠 |
| | | | イメンドカプセルセット | 1セット |
| * | | 劇 | イリノテカン塩酸塩点滴静注100mg「トーワ」 | 100mg5mL1瓶 |
| * | | 劇 | イリノテカン塩酸塩点滴静注40mg「トーワ」 | 40mg2mL1瓶 |
| | | 劇 | イレッサ錠250 | 250mg1錠 |

| 複数規格 | 備考 | 規制 | 医薬品名 | 規格単位 |
|------|----|----|-----------------------------|-----------------|
| | | | インクレミンシロップ5% | 1mL |
| | | | インジウムDTPA(111In)注 | 10MBq |
| | | | インジゴカルミン注20mg「AFP」 | 0.4%5mL1管 |
| * | | 劇 | インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 300単位1キット |
| * | | 劇 | インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」 | 300単位1キット |
| | | 劇 | インダシン静注用1mg | 1mg1瓶 |
| | 要時 | | インテバンクリーム1% | 1%1g |
| | | | インテバン外用液1% | 1%1mL |
| | | 劇 | インデラル錠10mg | 10mg1錠 |
| * | | | イントラリポス輸液10% | 250mL1袋 |
| * | | | イントラリポス輸液20% | 20%50mL1袋 |
| | | 劇 | インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 | 100mg1瓶 |
| * | | 劇 | インライタ錠1mg | 1mg1錠 |
| * | 要時 | 劇 | インライタ錠5mg | 5mg1錠 |
| | | | ヴォリブリス錠2.5mg | 2.5mg1錠 |
| | | | ウチダのシテイM | 10g |
| | | 劇 | ウテメリン注50mg | 1%5mL1管 |
| | | | ウブトラビ錠0.2mg | 0.2mg1錠 |
| | | 毒 | ウブレチド錠5mg | 5mg1錠 |
| | | | ウルソデオキシコール酸錠100mg「ZE」 | 100mg1錠 |
| | | | ウルソ顆粒5% | 5%1g |
| | | | ウルティプロ吸入用カプセル | 1カプセル |
| | | | ウレパールローション10% | 10%1g |
| | | | ウロアシス配合散 | 1g |
| * | | | ウログラフィン注60% | 60%100mL1瓶 |
| * | | | ウログラフィン注60% | 60%20mL1管 |
| * | 要時 | | ウロナーゼ冠動注用12万単位 | 120,000単位1瓶 |
| * | | | ウロナーゼ静注用6万単位 | 60,000単位1瓶 |
| | | | ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% | 3%3L1袋 |
| | | | ウロミテキサン注400mg | 400mg4mL1管 |
| | | | エキザルベ | 1g |
| | | | エクア錠50mg | 50mg1錠 |
| | | 劇 | エクザール注射用10mg | 10mg1瓶 |
| * | | | エクストラニール腹膜透析液 | 1.5L1袋(排液用バッグ付) |
| * | | | エクストラニール腹膜透析液 | 2L1袋 |
| * | | | エクストラニール腹膜透析液 | 2L1袋(排液用バッグ付) |
| | | 劇 | エクセグラン錠100mg | 100mg1錠 |
| | | | エコリンシ眼軟膏 | 1g |
| * | | | エスケレ坐剤「250」 | 250mg1個 |
| * | | | エスケレ坐剤「500」 | 500mg1個 |
| | 要時 | 劇 | エストラサイトカプセル156.7mg | 156.7mg1カプセル |
| | | | エストリール錠1mg*(持田) | 1mg1錠 |
| | | | エストリール腔錠0.5mg | 0.5mg1錠 |
| | | 劇 | エスポー注射液750 | 750国際単位0.5mL1管 |
| | | 毒 | エスラックス静注50mg/5.0mL | 50mg5mL1瓶 |
| * | | 劇 | エスワンタイホウ配合OD錠T20 | 20mg1錠(テガフル相当量) |
| * | | 劇 | エスワンタイホウ配合OD錠T25 | 25mg1錠(テガフル相当量) |
| | | | エタノール「ヨシダ」 | 10mL |
| | | | エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」 | 30mg100mL1キット |
| | | 向3 | エチゾラム錠0.5mg「アメル」 | 0.5mg1錠 |
| | | 劇 | エディロールカプセル0.75μg | 0.75μg1カプセル |
| | | 劇 | エトキシスクレロール1%注射液 | 1%30mL1瓶 |
| | | 劇 | エトポシド点滴静注液100mg「サンド」 | 100mg5mL1瓶 |
| * | | | エナラブリルマレイン酸塩錠2.5mg「MED」 | 2.5mg1錠 |
| * | | | エナラブリルマレイン酸塩錠5mg「MED」 | 5mg1錠 |
| | | | エナルモンデポー筋注125mg | 125mg1mL1管 |
| | | | エネーボ配合経腸用液 | 10mL |
| | | | エパデールS900 | 900mg1包 |
| | | 向3 | エバミール錠1.0 | 1mg1錠 |
| | | | エビスタ錠60mg | 60mg1錠 |
| | | | エピナスチン塩酸塩錠20mg「ファイザー」 | 20mg1錠 |
| | | 劇 | エビリファイ錠6mg | 6mg1錠 |

| 複数規格 | 備考 | 規制 | 医薬品名 | 規格単位 |
|------|----|----|--------------------------|-------------------|
| * | | 劇 | エビルピシン塩酸塩注射用10mg「サワイ」 | 10mg1瓶 |
| * | | 劇 | エビルピシン塩酸塩注射用50mg「サワイ」 | 50mg1瓶 |
| * | | | エフィエントOD錠20mg | 20mg1錠 |
| * | | | エフィエント錠3.75mg | 3.75mg1錠 |
| | 要時 | | エブクルーサ配合錠 | 1錠 |
| | | 劇 | エブトール250mg錠 | 250mg1錠 |
| | | 覚劇 | エフピーOD錠2.5 | 2.5mg1錠 |
| | | | エブランテルカプセル15mg | 15mg1カプセル |
| | | | エペリゾン塩酸塩錠50mg「旭化成」 | 50mg1錠 |
| | | 劇 | エポエチナルファBS注1500シリンジ「JCR」 | 1,500国際単位1mL1筒 |
| * | | 劇 | エボジン注シリンジ3000 | 3,000国際単位0.5mL1筒 |
| * | | 劇 | エボジン注シリンジ6000 | 6,000国際単位0.5mL1筒 |
| * | | 劇 | エボジン皮下注シリンジ12000 | 12,000国際単位0.5mL1筒 |
| * | 要時 | 劇 | エボジン皮下注シリンジ24000 | 24,000国際単位0.5mL1筒 |
| | | 劇 | エホチール注10mg | 1%1mL1管 |
| * | | 劇 | エムプリシティ点滴静注用300mg | 300mg1瓶 |
| * | | 劇 | エムプリシティ点滴静注用400mg | 400mg1瓶 |
| | | 劇 | エムラクリーム | 1g |
| | | 劇 | エムラパッチ | 1枚 |
| * | | | エリキユース錠2.5mg | 2.5mg1錠 |
| * | | | エリキユース錠5mg | 5mg1錠 |
| | | | エリスロシンドライシロップW20% | 200mg1g |
| | 要時 | | エリスロシン点滴静注用500mg | 500mg1瓶 |
| | | 劇 | エリル点滴静注液30mg | 30.8mg2mL1管 |
| * | | | エルカルチンFF錠100mg | 100mg1錠 |
| * | | | エルカルチンFF錠250mg | 250mg1錠 |
| | | | エルカルチンFF静注1000mgシリンジ | 1,000mg5mL1筒 |
| | | | エルカルチンFF内用液10% | 10%1mL |
| | | | エルサメット配合錠 | 1錠 |
| | | 劇 | エルシトニン注40単位 | 40エルカトニン単位1mL1管 |
| * | | | エルネオパNF1号輸液 | 1000mL1キット |
| * | | | エルネオパNF2号輸液 | 1000mL1キット |
| * | | | エルネオパNF2号輸液 | 1500mL1キット |
| | | | エレンタールP乳幼児用配合内用剤 | 10g |
| | 要時 | | エンクラッセ62.5µgエリプタ30吸入用 | 30吸入1キット |
| * | | | エンシュア・H | 10mL |
| * | | | エンシュア・リキッド | 10mL |
| | | 劇 | エンスプリング皮下注120mgシリンジ | 120mg1mL1筒 |
| | 要時 | 劇 | エンタイビオ点滴静注用300mg | 300mg1瓶 |
| | | | エンテロノン-R散 | 1g |
| | | 劇 | エンドキサン錠50mg | 50mg1錠 |
| | | | エンペシドクリーム1% | 1%1g |
| | | | エンレスト錠100mg | 100mg1錠 |
| * | | | オイパロミン300注100mL | 61.24%100mL1瓶 |
| * | | | オイパロミン300注20mL | 61.24%20mL1瓶 |
| | | | オイラックスクリーム10% | 10%10g |
| | | | オーキシス9µgタービューヘイラー60吸入 | 540µg1キット(9µg) |
| | | | オーグメンチン配合錠250RS | (375mg)1錠 |
| * | | 毒 | オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」 | 100mg20mL1瓶 |
| * | | 毒 | オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」 | 50mg10mL1瓶 |
| * | | 麻劇 | オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」 | 20mg1カプセル |
| * | | 麻劇 | オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」 | 5mg1カプセル |
| * | | 麻劇 | オキノーム散10mg | 10mg1包 |
| * | | 麻劇 | オキノーム散2.5mg | 2.5mg1包 |
| * | | 麻劇 | オキファスト注10mg | 1%1mL1管 |
| * | | 麻劇 | オキファスト注50mg | 1%5mL1管 |
| | | | オクソラレンローション0.3% | 0.3%1mL |
| | | 劇 | オクトレオチド酢酸塩皮下注50µg「サンド」 | 50µg1mL1管 |
| | | | オザグレルNa注80mgシリンジ「IP」 | 80mg4mL1筒 |
| | 製剤 | | オスバン消毒液10% | 10%10mL |
| | | | オゼックス細粒小児用15% | 150mg1g |
| | | | オゼックス点眼液0.3% | 0.3%1mL |

| 複数規格 | 備考 | 規制 | 医薬品名 | 規格単位 |
|------|----|----|--------------------------|-------------------|
| | | | オセルタミビルDS3%「サワイ」 | 3%1g |
| | | 劇 | オゼンピック皮下注0.25mgSD | 0.25mg0.5mL1キット |
| | | 劇 | オノアクト点滴静注用50mg | 50mg1瓶 |
| | | 劇 | オビソート注射用0.1g | 100mg1管(溶解液付) |
| * | | 劇 | オフエブカプセル100mg | 100mg1カプセル |
| * | | 劇 | オフエブカプセル150mg | 150mg1カプセル |
| | | 劇 | オブジーボ点滴静注240mg | 240mg24mL1瓶 |
| | | 劇 | オブスミット錠10mg | 10mg1錠 |
| | | 麻劇 | オブソ内服液5mg | 5mg2.5mL1包 |
| | | | オペガードMA眼灌流液 | 20mL1管 |
| | | | オペガン1.1眼粘弾剤1% | 1%1.1mL1筒 |
| | | | オベリード1.1眼粘弾剤1% | 1%1.1mL1筒 |
| | | | オメプラゾール注射用20mg「日医工」 | 20mg1瓶 |
| | 要時 | | オラペナム小児用細粒10% | 100mg1g |
| * | 製剤 | | オリブ油*(丸石) | 10mL |
| * | 製剤 | | オリブ油「ヨシダ」 | 10mL |
| | | 劇 | オルケディア錠1mg | 1mg1錠 |
| | | 劇 | オルダミン注射用1g | 10%10g1瓶 |
| | | | オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 | 20mg1錠 |
| | | 劇 | オンコピン注射用1mg | 1mg1瓶 |
| | 要時 | 劇 | オンパットロ点滴静注2mg/mL | 8.8mg4.4mL1瓶 |
| | 要時 | | オンブレス吸入用カプセル150μg | 150μg1カプセル |
| * | | 毒 | カーディオオライト第一 | 1回分 |
| * | | | カーディオオライト注射液第一 | 600MBq1筒 |
| * | | | カーボスター透析剤・L | 6L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付) |
| * | | | カーボスター透析剤・L | 9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付) |
| * | | 毒 | カイプロリス点滴静注用10mg | 10mg1瓶 |
| * | | 毒 | カイプロリス点滴静注用40mg | 40mg1瓶 |
| | 要時 | 劇 | ガザイバ点滴静注1000mg | 1,000mg40mL1瓶 |
| | | | ガスコンドロップ内用液2% | 2%1mL |
| | | | ガスコン錠40mg | 40mg1錠 |
| | | | ガストログラフィン経口・注腸用 | 1mL |
| | | | ガスモチン散1% | 1%1g |
| | | | ガスモチン錠5mg | 5mg1錠 |
| | | | カタプレス錠75μg | 0.075mg1錠 |
| * | | 劇 | カドサイラ点滴静注用100mg | 100mg1瓶 |
| * | | 劇 | カドサイラ点滴静注用160mg | 160mg1瓶 |
| | 要時 | | カナグル錠100mg | 100mg1錠 |
| | | | カナマイシンカプセル250mg「明治」 | 250mg1カプセル |
| | | 劇 | カバサル錠1.0mg | 1mg1錠 |
| | | | ガバペン錠400mg | 400mg1錠 |
| | | | カプトリル細粒5% | 5%1g |
| * | | 劇 | ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」 | 100mg1瓶 |
| * | | 劇 | ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」 | 500mg1瓶 |
| | | | カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」 | 100mg1錠 |
| | 要時 | | ガランターゼ散50% | 50%1g |
| | | | カリメート経口液20% | 20%25g1包 |
| | | 劇 | カルシトリオールカプセル0.5μg「テバ」 | 0.5μg1カプセル |
| * | | 劇 | カルセド注射用20mg | 20mg1瓶 |
| * | | 劇 | カルセド注射用50mg | 50mg1瓶 |
| | | | カルチコール注射液8.5%5mL | 8.5%5mL1管 |
| | | | カルディオダイン注 | 10MBq |
| | | | カルナクリン錠50 | 50単位1錠 |
| | | | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日 | 10mg1錠 |
| | | | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg | 0.5%10mL1管 |
| | | | カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」 | 200mg1錠 |
| | | | カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 | 2.5mg1錠 |
| | | 劇 | カルボカインアンプル注1% | 1%10mL1管 |
| | | | カルボシステインシロップ小児用5%「テバ」 | 5%1mL |
| | | | カルボシステイン細粒50%「ツルハラ」 | 50%1g |
| | | | カルボシステイン錠250mg「トーワ」 | 250mg1錠 |
| * | | 毒 | カルボプラチン注射液150mg「日医工」 | 150mg15mL1瓶 |

| 複数規格 | 備考 | 規制 | 医薬品名 | 規格単位 |
|------|----|----|----------------------------------|-------------------|
| * | | 毒 | カルボプラチン注射液450mg「日医工」 | 450mg45mL1瓶 |
| * | | 毒 | カルボプラチン注射液50mg「日医工」 | 50mg5mL1瓶 |
| * | | 毒 | カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 | 150mg15mL1瓶 |
| * | | 毒 | カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」 | 450mg45mL1瓶 |
| * | | 毒 | カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 | 50mg5mL1瓶 |
| | | 劇 | カロナールシロップ2% | 2%1mL |
| | | | カロナール細粒50% | 50%1g |
| | | | カロナール錠300 | 300mg1錠 |
| * | | 劇 | カンサイダス点滴静注用50mg | 50mg1瓶 |
| * | | 劇 | カンサイダス点滴静注用70mg | 70mg1瓶 |
| | | 劇 | カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」 | 200mg1瓶 |
| | | 劇 | キイトルーダ点滴静注100mg | 100mg4mL1瓶 |
| * | | | キシロカインゼリー2% | 2%1mL |
| * | | 劇 | キシロカインビスカス2% | 2%1mL |
| * | | 劇 | キシロカインポンプスプレー8% | 1g |
| * | | | キシロカイン液「4%」 | 4%1mL |
| * | | 劇 | キシロカイン注ポリアンプ0.5% | 0.5%10mL1管 |
| * | | 劇 | キシロカイン注ポリアンプ1% | 1%10mL1管 |
| * | | 劇 | キシロカイン注ポリアンプ2% | 2%10mL1管 |
| * | | 劇 | キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000) | 0.5%10mLバイアル |
| * | | 劇 | キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000) | 1%10mLバイアル |
| * | | 劇 | キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80,000) | 2%10mLバイアル |
| * | | | キシロカイン点眼液4% | 4%1mL |
| | | | キックリンカプセル250mg | 250mg1カプセル |
| | | | キネダック錠50mg | 50mg1錠 |
| | | | キプレスチュアブル錠5mg | 5mg1錠 |
| | | | キプレス錠10mg | 10mg1錠 |
| * | | 劇 | ギャバロン髄注0.005% | 0.005%1mL1管 |
| * | 要時 | 劇 | ギャバロン髄注0.05% | 0.05%20mL1管 |
| * | 要時 | 劇 | ギャバロン髄注0.2% | 0.2%5mL1管 |
| | | | キャブピリン配合錠 | 1錠 |
| | 要時 | | キューバル100エアゾール | 15mg8.7g1瓶 |
| | | | キュービシン静注用350mg | 350mg1瓶 |
| | | 劇 | キョウニン水「マルイシ」 | 10mL |
| * | | 劇 | キロサイドN注1g | 1g1瓶 |
| * | | 劇 | キロサイドN注400mg | 400mg1管 |
| * | | 劇 | キロサイド注200mg | 200mg1管 |
| * | | 劇 | キロサイド注40mg | 40mg1管 |
| | | | キンダベート軟膏0.05% | 0.05%1g |
| | | | キンダリー透析剤AF2号 | 9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付) |
| | | | ゲーフィス錠5mg | 5mg1錠 |
| * | | 劇 | クエチアピン錠100mg「トーワ」 | 100mg1錠 |
| * | | 劇 | クエチアピン錠25mg「トーワ」 | 25mg1錠 |
| | | | クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP | 10MBq |
| | | | クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 | 鉄50mg1錠 |
| * | | 劇 | グラセプターカプセル0.5mg | 0.5mg1カプセル |
| * | | 劇 | グラセプターカプセル1mg | 1mg1カプセル |
| | | 劇 | グラニセトロン静注液3mg「F」 | 3mg3mL1管 |
| * | | | クラビット点眼液0.5% | 0.5%1mL |
| * | | | クラビット点眼液1.5% | 1.5%1mL |
| | | | クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」 | 100mg1g |
| | | | クラリスロマイシン錠200mg「マイラン」 | 200mg1錠 |
| | | | グリセリン「マルイシ」 | 10mL |
| | | | グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」 | 200mL1袋 |
| * | | | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 | 50%120mL1個 |
| * | | | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 | 50%30mL1個 |
| * | | | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 | 50%60mL1個 |
| * | | | グリセリン浣腸液50%「東豊」 | 50%10mL |
| | | | グリチロン配合錠 | 1錠 |
| | | | クリプトン(81mKr)ジェネレータ | 1患者当り |
| | | 劇 | グリミクロン錠40mg | 40mg1錠 |
| * | | 劇 | グリメピリドOD錠1mg「トーワ」 | 1mg1錠 |

| 複数規格 | 備考 | 規制 | 医薬品名 | 規格単位 |
|------|----|----|----------------------------|-------------------------|
| * | | 劇 | グリメピリドOD錠1mg「日医工」 | 1mg1錠 |
| * | | | クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「N | 300mg1管 |
| * | | | クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サ | 600mg1管 |
| | | | グルアセト35注 | 500mL1瓶 |
| | | 劇 | グルカゴン注射用1単位「ILS」 | 1U.S.P.単位1瓶(溶解液付) |
| | | | グルコンサンK細粒4mEq/g | カリウム4mEq1g |
| * | | | グルトバ注2400万 | 2,400万国際単位1瓶(溶解液付) |
| * | | | グルトバ注600万 | 600万国際単位1瓶(溶解液付) |
| | | | グルファスト錠10mg | 10mg1錠 |
| | | | グレースビット錠50mg | 50mg1錠 |
| | | 劇 | クレキサン皮下注キット2000IU | 2,000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒 |
| | | | クレメジン速崩錠500mg | 500mg1錠 |
| * | | | グロウジェクトBC注射用8mg | 8mg1筒(溶解液付) |
| * | | | グロウジェクト皮下注12mg | 12mg1筒 |
| | | | クロピドグレル錠75mg「SANIK」 | 75mg1錠 |
| | | | クロマイ-P軟膏 | 1g |
| | | | クロマイ腫錠100mg | 100mg1錠 |
| | | | クロミッド錠50mg | 50mg1錠 |
| | | | クロモグリク酸Na吸入液1%「アメル」 | 1%2mL1管 |
| | | | ケイキサレート散 | 1g |
| | | | ケイツーN静注10mg | 10mg1管 |
| | | | ケイツーシロップ0.2% | 0.2%1mL |
| | | | ゲーベンクリーム1% | 1%1g |
| | | | ケーワン錠5mg | 5mg1錠 |
| | | | ケタスカプセル10mg | 10mg1カプセル |
| | | 麻劇 | ケタラル静注用200mg | 200mg20mL1瓶 |
| | | | ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」 | 2%1g |
| | | | ケトチフェンDS小児用0.1%「サワイ」 | 0.1%1g |
| | | | ケトプロフェンテープ20mg「日医工」 | 7cm×10cm1枚 |
| | | | ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL | 40mg1瓶 |
| | | | ケフラルカプセル250mg | 250mg1カプセル |
| | | | ケフラル細粒小児用100mg | 100mg1g |
| * | | 劇 | ゲムシタビン点滴静注用1g「NK」 | 1g1瓶 |
| * | | 劇 | ゲムシタビン点滴静注用200mg「NK」 | 200mg1瓶 |
| | | | ケラチナミンコーワクリーム20% | 20%1g |
| * | | 劇 | ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「日医工」 | 40mg1管 |
| * | | 劇 | ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」 | 60mg1管 |
| | | | ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」 | 1mg1g |
| | | 劇 | コアベータ静注用12.5mg | 12.5mg1瓶 |
| | | | コートリル錠10mg | 10mg1錠 |
| | 要時 | | コートロシン注射用0.25mg | 0.25mg1瓶 |
| | | | コスパノン錠80mg | 80mg1錠 |
| | | 劇 | コデインリン酸塩散1%「タケダ」 | 1%1g |
| | | | ゴナールエフ皮下注ベン450 | 450国際単位0.75mL1筒 |
| * | | 劇 | ゴナックス皮下注用120mg | 120mg1瓶(溶解液付) |
| * | | 劇 | ゴナックス皮下注用80mg | 80mg1瓶(溶解液付) |
| | | 劇 | コホリン静注用7.5mg | 7.5mg1瓶(溶解液付) |
| | | | コムタン錠100mg | 100mg1錠 |
| | | | コメリアンコーワ錠100 | 100mg1錠 |
| | | 劇 | コララン錠2.5mg | 2.5mg1錠 |
| | | | コランチル配合顆粒 | 1g |
| | | 劇 | コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 | 0.5mg1錠 |
| | | 劇 | コントミン筋注10mg | 0.5%2mL1管 |
| | | | コントミン糖衣錠12.5mg | 12.5mg1錠 |
| * | | | サージェル・アブソーバブル・ヘモスタット | ユニット15.2cm×22.9cm |
| * | | | サージェル・アブソーバブル・ヘモスタット | 綿型5.1cm×2.5cm1枚 |
| | | 劇 | サーティカン錠0.25mg | 0.25mg1錠 |
| | | | ザーネ軟膏0.5% | 5,000単位1g |
| | | | サーファクテン気管注入用120mg | 120mg1瓶 |
| | | 劇 | サイトテック錠200 | 200µg1錠 |
| | | | サイプレジン1%点眼液 | 1%1mL |
| | 要時 | 劇 | サイモグロブリン点滴静注用25mg | 25mg1瓶 |

| 複数規格 | 備考 | 規制 | 医薬品名 | 規格単位 |
|------|----|----|-------------------------|-------------------|
| * | | 劇 | サイラムザ点滴静注液100mg | 100mg10mL1瓶 |
| * | | 劇 | サイラムザ点滴静注液500mg | 500mg50mL1瓶 |
| | | 向2 | サイレース静注2mg | 2mg1管 |
| | | 劇 | サインバルタカプセル20mg | 20mg1カプセル |
| | | | サヴィオゾール輸液 | 500mL1袋 |
| | | | ザジテン点鼻液0.05% | 6.048mg8mL1瓶 |
| | | | サトウザルベ軟膏10% | 10g |
| | | | ザファテック錠100mg | 100mg1錠 |
| | | | サブパック血液ろ過用補充液-Bi | 2020mL1キット |
| * | 要時 | 劇 | サムスカOD錠30mg | 30mg1錠 |
| * | | 劇 | サムスカOD錠7.5mg | 7.5mg1錠 |
| | | | サラゾピリン錠500mg | 500mg1錠 |
| | | | サリパラ液 | 10mL |
| | 要時 | | サリベートエアゾール | 50g1個 |
| * | | 劇 | ザルトラップ点滴静注100mg | 100mg4mL1瓶 |
| * | | 劇 | ザルトラップ点滴静注200mg | 200mg8mL1瓶 |
| | | | サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 100mg1錠 |
| | | 毒 | サレドカプセル100 | 100mg1カプセル |
| | | | サワシリン細粒10% | 100mg1g |
| | | | サンコバ点眼液0.02% | 0.02%5mL1瓶 |
| | | 劇 | サンディミュン点滴静注用250mg | 5%5mL1管 |
| | | 劇 | サンピロ点眼液2% | 2%5mL1瓶 |
| | | 劇 | サンリズム注射液50 | 50mg5mL1管 |
| | | | ジアグノグリーン注射用25mg | 25mg1瓶(溶解液付) |
| | | 劇 | ジアゾキシドカプセル25mg「OP」 | 25mg1カプセル |
| | | | ジーラスタ皮下注3.6mg | 3.6mg0.36mL1筒 |
| | | 劇 | ジェイゾロフト錠50mg | 50mg1錠 |
| | | | ジェニナック錠200mg | 200mg1錠 |
| * | | | ジェノトロピンTC注用12mg | 12mg1筒(溶解液付) |
| * | 要時 | | ジェノトロピンTC注用5.3mg | 5.33mg1筒(溶解液付) |
| * | | | ジェノトロピンゴークイック注用12mg | 12mg1キット |
| * | | | ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg | 5.33mg1キット |
| | | 毒 | ジェブタナ点滴静注60mg | 60mg1.5mL1瓶(溶解液付) |
| | 要時 | | シェルガン0.5眼粘弾剤 | 0.5mL1筒 |
| | | | ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5 | 5%1mL |
| * | 要時 | 劇 | ジオトリフ錠20mg | 20mg1錠 |
| * | 要時 | 劇 | ジオトリフ錠30mg | 30mg1錠 |
| * | 要時 | 劇 | ジオトリフ錠40mg | 40mg1錠 |
| | | | ジクロード点眼液0.1% | 0.1%1mL |
| * | | 劇 | ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 | 25mg1個 |
| * | | 劇 | ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」 | 50mg1個 |
| | | 劇 | ジゴシン散0.1% | 0.1%1g |
| | | 劇 | ジゴシン注0.25mg | 0.025%1mL1管 |
| * | | 毒 | シスプラチン注10mg「日医工」 | 10mg20mL1瓶 |
| * | | 毒 | シスプラチン注25mg「日医工」 | 25mg50mL1瓶 |
| * | | 毒 | シスプラチン注50mg「日医工」 | 50mg100mL1瓶 |
| | | | ジスロマック錠250mg | 250mg1錠 |
| | | | ジスロマック点滴静注用500mg | 500mg1瓶 |
| | | 劇 | ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「日医工」 | 150mg1錠 |
| * | | | シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU | 2,000JAU1錠 |
| * | | | シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU | 5,000JAU1錠 |
| | | | シナール配合錠 | 1錠 |
| * | | | シナジス筋注液100mg | 100mg1mL1瓶 |
| * | 要時 | | シナジス筋注液50mg | 50mg0.5mL1瓶 |
| | | | ジビリダモール錠25mg「JG」 | 25mg1錠 |
| | | 劇 | ジブレキサザイデス錠5mg | 5mg1錠 |
| | | 劇 | ジブレキサ筋注用10mg | 10mg1瓶 |
| | | 劇 | ジブレキサ細粒1% | 1%1g |
| | | | シプロフロキサシン錠200mg「日医工」 | 200mg1錠 |
| | | | ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0.05%「YD」 | 0.05%1g |
| | | 劇 | シベノール錠50mg | 50mg1錠 |
| | | 劇 | シベノール静注70mg | 70mg5mL1管 |

| 複数規格 | 備考 | 規制 | 医薬品名 | 規格単位 |
|------|----|----|----------------------------|---------------|
| | | | シムビコートタービュヘイラー60吸入 | 60吸入1キット |
| | 要時 | 劇 | シムレクト静注用20mg | 20mg1瓶(溶解液付) |
| | | | ジャディアンス錠10mg | 10mg1錠 |
| * | 要時 | 劇 | ジャドニュ顆粒分包360mg | 360mg1包 |
| * | 要時 | 劇 | ジャドニュ顆粒分包90mg | 90mg1包 |
| | | | ジャヌビア錠50mg | 50mg1錠 |
| | | 劇 | シュアポスト錠0.25mg | 0.25mg1錠 |
| | | | ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」 | 100mg1カプセル |
| | | 劇 | ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」 | 50mg1管 |
| | | | シルニジピン錠10mg「サワイ」 | 10mg1錠 |
| | | | シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」 | 100mg1錠 |
| | | 劇 | シロドシンOD錠4mg「DSEP」 | 4mg1錠 |
| | | 劇 | シンビット静注用50mg | 50mg1瓶 |
| | | | スインプロイク錠0.2mg | 0.2mg1錠 |
| | | | スーグラ錠50mg | 50mg1錠 |
| | | 劇 | スーテントカプセル12.5mg | 12.5mg1カプセル |
| | | | スクラルファート内用液10%「日医工」 | 10%1mL |
| | | | スクラルファート顆粒90%「トーワ」 | 90%1g |
| | | 劇 | スチバーガ錠40mg | 40mg1錠 |
| | | | ステイセーフバランス 1/2.5 腹膜透析液 | 2L1袋(排液用バッグ付) |
| | 要時 | 劇 | ステラーラ皮下注45mgシリンジ | 45mg0.5mL1筒 |
| | 要時 | 劇 | ストロメクトール錠3mg | 3mg1錠 |
| | 要時 | 劇 | スパニジン点滴静注用100mg | 100mg1瓶 |
| | | | スピール膏M | 25cm21枚 |
| | | | スピオルトレスピマット28吸入 | 28吸入1キット |
| | | | スピリーバ2.5µgレスピマット60吸入 | 150µg1キット |
| | | | スピロラクトン錠25mg「テバ」 | 25mg1錠 |
| | | | スピロペント錠10µg | 10µg1錠 |
| | | 劇 | ズファジラン筋注5mg | 0.5%1mL1管 |
| | | | ズファジラン錠10mg | 10mg1錠 |
| * | 要時 | 劇 | スプリセル錠20mg | 20mg1錠 |
| * | 要時 | 劇 | スプリセル錠50mg | 50mg1錠 |
| * | | | スポンゼル | 10cm×7cm1枚 |
| * | | | スポンゼル | 5cm×2.5cm1枚 |
| | | | スルバシリン静注用1.5g | (1.5g)1瓶 |
| | | | セイブル錠50mg | 50mg1錠 |
| | | 劇 | ゼヴァリン イットリウム(90Y)静注用セット | 1セット |
| | | 劇 | ゼヴァリン インジウム(111In)静注用セット | 1セット |
| | | | ゼチーア錠10mg | 10mg1錠 |
| | | 向3 | セパゾン錠2 | 2mg1錠 |
| | | 劇 | セバミット-R細粒2% | 2%1g |
| * | | | セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」 | 500mg1瓶 |
| * | | | セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」 | 1g1瓶 |
| * | | | セファゾリンナトリウム注射用2g「日医工」 | 2g1瓶 |
| | | | セファドール錠25mg | 25mg1錠 |
| | | 劇 | セファランチン注10mg | 0.5%2mL1管 |
| | | | セファランチン末1% | 1%1g |
| | | | セフォセフ静注用1g | (1g)1瓶 |
| * | | | セフォタックス注射用0.5g | 500mg1瓶 |
| * | | | セフォタックス注射用1g | 1g1瓶 |
| * | | | セフォチアム塩酸塩静注用0.5g「NP」 | 500mg1瓶 |
| * | | | セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」 | 1g1瓶 |
| | | | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「ファイザー」 | 100mg1錠 |
| | | | セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「サワイ」 | 100mg1g |
| | | | セフジニルカプセル100mg「日医工」 | 100mg1カプセル |
| | | | セフジニル細粒10%小児用「日医工」 | 100mg1g |
| * | | | セフタジジム静注用0.5g「日医工」 | 500mg1瓶 |
| * | | | セフタジジム静注用1g「マイラン」 | 1g1瓶 |
| | | | セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」 | 1g1瓶 |
| | | | セフポドキシムプロキセチル錠100mg「トーワ」 | 100mg1錠 |
| | | | セフメタゾールNa静注用1g「NP」 | 1g1瓶 |
| | | | セララ錠50mg | 50mg1錠 |

| 複数規格 | 備考 | 規制 | 医薬品名 | 規格単位 |
|------|----|------|------------------------|---------------------|
| | | 劇 | セルセプトカプセル250 | 250mg1カプセル |
| | | 劇 | ゼルヤンツ錠5mg | 5mg1錠 |
| | | 劇 | セレコックス錠100mg | 100mg1錠 |
| | | | セレジストOD錠5mg | 5mg1錠 |
| | | | セレスタミン配合錠 | 1錠 |
| | | | セレニカR顆粒40% | 40%1g |
| | | 劇 | セレネース細粒1% | 1%1g |
| | | 劇 | セレネース注5mg | 0.5%1mL1管 |
| | | | セレプロテックキット | 1回分 |
| | | 劇 | ゼローダ錠300 | 300mg1錠 |
| | | 劇 | セロケン錠20mg | 20mg1錠 |
| | | | ゼンタコートカプセル3mg | 3mg1カプセル |
| | | | センノサイド顆粒8%「EMEC」 | 8%1g |
| | | | センノシド錠12mg「サワイ」 | 12mg1錠 |
| | | 劇 | ゾーミッグRM錠2.5mg | 2.5mg1錠 |
| | | 劇・向2 | ソセゴン注射液15mg | 15mg1管 |
| | | | ソタコール錠40mg | 40mg1錠 |
| | | | ソナゾイド注射用16μL | 1瓶(溶解液付) |
| | | 劇 | ゾニサミド散20%「アメル」 | 20%1g |
| | | | ゾビラックス眼軟膏3% | 3%1g |
| | | | ゾビラックス顆粒40% | 40%1g |
| | | | ソフラチュール貼付剤10cm | (10.8mg)10cm×10cm1枚 |
| * | 要時 | 劇 | ゾラデックス3.6mgデポ | 3.6mg1筒(ゴセレリンとして) |
| * | | 劇 | ゾラデックスLA10.8mgデポ | 10.8mg1筒(ゴセレリンとして) |
| | | 向3 | ソラナックス0.4mg錠 | 0.4mg1錠 |
| | | | ソリタ-T配合顆粒2号 | 4g1包 |
| | | | ソリュージェンG注 | 500mL1瓶 |
| * | | | ソル・コーテフ静注用250mg | 250mg1瓶(溶解液付) |
| * | | | ソル・コーテフ静注用500mg | 500mg1瓶(溶解液付) |
| * | | | ソル・コーテフ注射用100mg | 100mg1瓶(溶解液付) |
| * | | | ソル・メドロール静注用1000mg | 1g1瓶(溶解液付) |
| * | | | ソル・メドロール静注用125mg | 125mg1瓶(溶解液付) |
| * | | | ソル・メドロール静注用40mg | 40mg1瓶(溶解液付) |
| * | | | ソル・メドロール静注用500mg | 500mg1瓶(溶解液付) |
| * | | | ソルデム1輸液 | 200mL1袋 |
| * | | | ソルデム1輸液 | 500mL1袋 |
| * | | | ソルデム3AG輸液 | 200mL1袋 |
| * | | | ソルデム3AG輸液 | 500mL1袋 |
| * | | | ソルデム3A輸液 | 200mL1袋 |
| * | | | ソルデム3A輸液 | 500mL1袋 |
| * | | | ソルデム6輸液 | 500mL1袋 |
| | | 劇 | ゾルトファイ配合注フレックスタッチ | 1キット |
| | | 向3 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「トーワ」 | 5mg1錠 |
| * | | | ソルラクトD輸液 | 500mL1袋 |
| * | | | ソルラクト輸液 | 500mL1袋 |
| * | | 劇 | ゾレア皮下注150mgシリンジ | 150mg1mL1筒 |
| * | | 劇 | ゾレア皮下注75mgシリンジ | 75mg0.5mL1筒 |
| | | 劇 | ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」 | 4mg5mL1瓶 |
| | | | ダイアコートクリーム0.05% | 0.05%1g |
| * | | 向3 | ダイアアップ坐剤10 | 10mg1個 |
| * | | 向3 | ダイアアップ坐剤4 | 4mg1個 |
| * | | 向3 | ダイアアップ坐剤6 | 6mg1個 |
| * | | | ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 | 1.5L1袋 |
| * | | | ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 | 1L1袋(排液用バッグ付) |
| * | | | ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 | 2.5L1袋 |
| * | | | ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 | 2L1袋(排液用バッグ付) |
| * | 要時 | | ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 | 5L1袋 |
| * | | | ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 | 1.5L1袋(排液用バッグ付) |
| * | | | ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 | 1L1袋(排液用バッグ付) |
| * | | | ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 | 2.5L1袋 |
| * | | | ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 | 2L1袋(排液用バッグ付) |
| * | 要時 | | ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 | 5L1袋 |

| 複数規格 | 備考 | 規制 | 医薬品名 | 規格単位 |
|------|----|----|---------------------------------|------------------------|
| | | | ダイアモックス錠250mg | 250mg1錠 |
| | | | ダイアモックス注射用500mg | 500mg1瓶 |
| | 要時 | 劇 | タイガシル点滴静注用50mg | 50mg1瓶 |
| | | | ダイフェン配合錠 | 1錠 |
| | | | タイロゲン筋注用0.9mg | 0.9mg1瓶 |
| | | 劇 | ダウノマイシン静注用20mg | 20mg1瓶 |
| | | 劇 | ダカルバジン注用100 | 100mg1瓶 |
| | | 劇 | ダクテル錠50mg | 50mg1錠 |
| | | 劇 | タグリッソ錠80mg | 80mg1錠 |
| * | | | タケキャブ錠10mg | 10mg1錠 |
| * | | | タケキャブ錠20mg | 20mg1錠 |
| | 要時 | 劇 | タシグナカプセル150mg | 150mg1カプセル |
| | | | タゾピベ配合静注用4.5「明治」 | (4.5g)1瓶 |
| | | | ダットスキャン静注 | 167MBq1筒 |
| | | | タミフルカプセル75 | 75mg1カプセル |
| | | | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「トーワ」 | 0.2mg1錠 |
| | | | タモキシフェン錠20mg「MYL」 | 20mg1錠 |
| * | | 劇 | ダラザレックス点滴静注100mg | 100mg5mL1瓶 |
| * | | 劇 | ダラザレックス点滴静注400mg | 400mg20mL1瓶 |
| | | | ダラシンTゲル1% | 1%1g |
| | | | ダラシンカプセル150mg | 150mg1カプセル |
| | | | タリージェ錠5mg | 5mg1錠 |
| | | | タリビッド眼軟膏0.3% | 0.3%1g |
| | | | タリビッド耳科用液0.3% | 3mg1mL |
| * | | 劇 | タルセバ錠100mg | 100mg1錠 |
| * | | 劇 | タルセバ錠150mg | 150mg1錠 |
| | | | ダルテパリンNa静注3000単位/12mLシリンジ「ニッコー」 | 3,000低分子ヘパリン国際単位12mL1筒 |
| * | | 劇 | ダルベポエチン アルファ注20µgシリンジ「KKF」 | 20µg0.5mL1筒 |
| * | | 劇 | ダルベポエチン アルファ注30µgシリンジ「KKF」 | 30µg0.5mL1筒 |
| * | | 劇 | ダルベポエチン アルファ注60µgシリンジ「KKF」 | 60µg0.5mL1筒 |
| | | 劇 | タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーワ」 | 10mg1錠 |
| | | | ダントリウムカプセル25mg | 25mg1カプセル |
| | | | ダントリウム静注用20mg | 20mg1瓶 |
| | | | タンニン酸アルブミン原末「マルイシ」 | 1g |
| | | | チアプリド錠25mg「テバ」 | 25mg1錠 |
| | | | チウラジール錠50mg | 50mg1錠 |
| | | | チエペネム点滴静注用0.5g | 500mg1瓶 |
| | | 劇 | チガソソカプセル10 | 10mg1カプセル |
| | | | チザニジン錠1mg「日医工」 | 1mg1錠 |
| | | | チモプトール点眼液0.5% | 0.5%1mL |
| | | | チョコラA錠1万単位 | 10,000単位1錠 |
| | | 劇 | チラーゼンS散0.01% | 0.01%1g |
| | | 劇 | チラーゼンS錠50µg | 50µg1錠 |
| | | | チンク油「ニッコー」 | 10g |
| | | | つくしA・M配合散 | 1g |
| | | | ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) | 1g |
| | | | ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) | 1g |
| | | | ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) | 1g |
| | | | ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) | 1g |
| | | | ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用) | 1g |
| | | | ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用) | 1g |
| | | | ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) | 1g |
| | | | ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用) | 1g |
| | 要時 | | ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用) | 1g |
| | | | ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用) | 1g |
| | | | ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) | 1g |
| | | | ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用) | 1g |
| | | | ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用) | 1g |
| | | | ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用) | 1g |
| | | | ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) | 1g |
| | | | ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) | 1g |
| | 要時 | | ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用) | 1g |

| 複数規格 | 備考 | 規制 | 医薬品名 | 規格単位 |
|------|-------|----|------------------------|-----------------|
| | | | ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) | 1g |
| | | | ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) | 1g |
| | | | ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用) | 1g |
| * | | | ツロブテロールテープ0.5mg「サワイ」 | 0.5mg1枚 |
| * | | | ツロブテロールテープ1mg「サワイ」 | 1mg1枚 |
| * | | | ツロブテロールテープ2mg「サワイ」 | 2mg1枚 |
| | | 劇 | テイコプラニン点滴静注用200mg「トーワ」 | 200mg1瓶 |
| | | 劇 | ディフェリンゲル0.1% | 0.1%1g |
| | | 劇 | テーカイン原末 | 1g |
| | | 劇 | テオフィリンドライシロップ20%「タカタ」 | 20%1g |
| * | | 劇 | テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」 | 200mg1錠 |
| * | | | テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」 | 100mg1錠 |
| | | | デカドロンエリキシル0.01% | 0.01%1mL |
| * | | | デカドロン錠0.5mg | 0.5mg1錠 |
| * | | | デカドロン錠4mg | 4mg1錠 |
| * | | | デキサート注射液1.65mg | 1.65mg0.5mL1管 |
| * | | | デキサート注射液6.6mg | 6.6mg2mL1瓶 |
| | | | デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 | 0.1%1g |
| | | | デキサンVG軟膏0.12% | 1g |
| * | | | テクネDMSAキット | 1回分 |
| * | | | テクネDTPAキット | 1回分 |
| * | | | テクネMAAキット | 1回分 |
| * | | | テクネMAG3キット | 1回分 |
| * | | | テクネMDPキット | 1回分 |
| * | | | テクネMDP注射液 | 370MBq1筒 |
| * | | | テクネシンチ注-10M | 10MBq |
| * | | | テクネピロリン酸キット | 1回分 |
| | | | テクネフチン酸キット | 1回分 |
| | | | テグレート細粒50% | 50%1g |
| | | | テグレート錠200mg | 200mg1錠 |
| | 要時 | 劇 | デシコビ配合錠HT | 1錠 |
| | 要時 | 劇 | デスフェラル注射用500mg | 500mg1瓶 |
| | | 劇 | デスマブレシン・スプレー2.5協和 | 125µg1瓶 |
| | | 劇 | テセントリック点滴静注1200mg | 1,200mg20mL1瓶 |
| | 要時・特生 | | テタノブリンIH静注1500単位 | 1,500国際単位1瓶 |
| | 特生 | | テタノブリン筋注用250単位 | 250国際単位1瓶 |
| | | 劇 | テトカイン注用20mg「杏林」 | 20mg1瓶 |
| | | | デトキソール静注液2g | 10%20mL1瓶 |
| | | | テネリア錠20mg | 20mg1錠 |
| | | | デノサリン1輸液 | 500mL1袋 |
| | | 毒 | デノシン点滴静注用500mg | 500mg1瓶 |
| | | 劇 | テノゼット錠300mg | 300mg1錠 |
| | | | デノタスチュアブル配合錠 | 1錠 |
| | | | デバケンR錠100mg | 100mg1錠 |
| | | | テブレノンカプセル50mg「トーワ」 | 50mg1カプセル |
| | | | テブレノン細粒10%「トーワ」 | 10%1g |
| | | 毒 | テモダール点滴静注用100mg | 100mg1瓶 |
| | 要時 | 劇 | デュピクセント皮下注300mgシリンジ | 300mg2mL1筒 |
| | | | デュファストン錠5mg | 5mg1錠 |
| * | 要時 | 麻劇 | デュロテップMTパッチ2.1mg | 2.1mg1枚 |
| * | 要時 | 麻劇 | デュロテップMTパッチ4.2mg | 4.2mg1枚 |
| * | 要時 | 麻劇 | デュロテップMTパッチ8.4mg | 8.4mg1枚 |
| | | | テリボン皮下注用56.5µg | 56.5µg1瓶(溶解液付) |
| | | | テルビナフィン錠125mg「タナベ」 | 125mg1錠 |
| | | | テルフィス点滴静注 | 500mL1袋 |
| | | | テルミサルタン錠40mg「DSEP」 | 40mg1錠 |
| | | 劇 | テルモベート軟膏0.05% | 0.05%1g |
| | | | テルモ生食 | 1L1袋 |
| | | | テレミンソフト坐薬10mg | 10mg1個 |
| | | 劇 | トーリセル点滴静注液25mg | 25mg1mL1瓶(希釈液付) |
| | | | ドキサゾシン錠2mg「YD」 | 2mg1錠 |
| | | 劇 | ドキシル注20mg | 20mg10mL1瓶 |

| 複数規格 | 備考 | 規制 | 医薬品名 | 規格単位 |
|------|----|----|---------------------------|------------------|
| * | | 劇 | ドキシソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」 | 10mg1瓶 |
| * | | 劇 | ドキシソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」 | 50mg1瓶 |
| | | 劇 | ドグマチール細粒50% | 50%1g |
| | | | ドグマチール錠50mg | 50mg1錠 |
| | | | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg | 200mg1カプセル |
| * | | 毒 | ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」 | 20mg1mL1瓶 |
| * | | 毒 | ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」 | 80mg4mL1瓶 |
| | | | ドバストン静注25mg | 0.25%10mL1管 |
| | | | ドパゾール錠200mg | 200mg1錠 |
| * | | 劇 | ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「アイロム」 | 100mg5mL1管 |
| * | | 劇 | ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット「ファイザ | 0.1%200mL1袋 |
| | | | トピナ錠100mg | 100mg1錠 |
| | | 劇 | トブシムクリーム0.05% | 0.05%1g |
| | | 劇 | トブシム軟膏0.05% | 0.05%1g |
| | | | ドブスOD錠100mg | 100mg1錠 |
| | | 劇 | ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」 | 100mg1管 |
| | | 劇 | ドブポン注0.3%シリンジ | 0.3%50mL1筒 |
| | | 劇 | ドブラム注射液400mg | 20mg1mLバイアル |
| | | | トラゼンタ錠5mg | 5mg1錠 |
| | | 劇 | トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」 | 50mg1錠 |
| | | | トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」 | 250mg1カプセル |
| | | | トラネキサム酸注射液1000mg「テバ」 | 10%10mL1管 |
| | | | トラベルミン配合錠 | 1錠 |
| | | 劇 | トラマールOD錠25mg | 25mg1錠 |
| | | 劇 | トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」 | 0.118%1mL |
| | | 劇 | トラムセット配合錠 | 1錠 |
| | | | トランコロン錠7.5mg | 7.5mg1錠 |
| | | 劇 | トリクロリールシロップ10% | 10%1mL |
| | | | トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」 | 2mg1錠 |
| | 要時 | 毒 | トリセノックス注10mg | 10mg1管 |
| | | | トリノシンS注射液20mg | 20mg1管 |
| | | | トリプタノール錠10 | 10mg1錠 |
| | | | トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「日医工」 | 100mg1錠 |
| | | 劇 | トリンテリックス錠10mg | 10mg1錠 |
| | | | トルソプト点眼液1% | 1%1mL |
| | | 劇 | トルリシティ皮下注0.75mgアテオス | 0.75mg0.5mL1キット |
| | | 劇 | トレアキシン点滴静注液100mg/4mL | 100mg4mL1瓶 |
| | | | トレランG液75g | 225mL1瓶 |
| | | 劇 | トレシーバ注フレックスタッチ | 300単位1キット |
| * | | 劇 | トレプロスト注射液100mg | 100mg20mL1瓶 |
| * | 要時 | 劇 | トレプロスト注射液200mg | 200mg20mL1瓶 |
| * | | 劇 | トレプロスト注射液20mg | 20mg20mL1瓶 |
| * | | 劇 | トレプロスト注射液50mg | 50mg20mL1瓶 |
| | | 劇 | ドロレプタン注射液25mg | 2.5mg1mLバイアル |
| | | | トロンビン液モチダソフトボトル1万 | 10,000単位10mL1キット |
| | | 劇 | ナイキサン錠100mg | 100mg1錠 |
| | | | ナウゼリンOD錠10 | 10mg1錠 |
| * | | | ナウゼリン坐剤10 | 10mg1個 |
| * | | | ナウゼリン坐剤60 | 60mg1個 |
| | | 劇 | ナゼアOD錠0.1mg | 0.1mg1錠 |
| | | 劇 | ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「旭化成」 | 50mg1瓶 |
| | | | ナフトピジルOD錠25mg「EE」 | 25mg1錠 |
| * | | 麻劇 | ナルサス錠2mg | 2mg1錠 |
| * | | 麻劇 | ナルサス錠6mg | 6mg1錠 |
| | | 麻劇 | ナルベイン注2mg | 2mg1mL1管 |
| | | 麻劇 | ナルラビド錠1mg | 1mg1錠 |
| | | 劇 | ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」 | 0.2mg1mL1管 |
| | | | ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」 | 10%1g |
| | | | ニコランジル錠5mg「トーワ」 | 5mg1錠 |
| | | | ニコランジル点滴静注用12mg「日医工」 | 12mg1瓶 |
| | | | ニセルゴリン錠5mg「トーワ」 | 5mg1錠 |
| | | | ニゾラルローション2% | 2%1g |

| 複数規格 | 備考 | 規制 | 医薬品名 | 規格単位 |
|------|----|------|---------------------------|-----------------|
| | | 毒 | ニトプロ持続静注液6mg | 6mg2mL1管 |
| | | 劇 | ニトログリセリン点滴静注25mg/50mL「TE」 | 25mg50mL1袋 |
| | | 劇 | ニトロダームTTS25mg | (25mg)10cm21枚 |
| | | 劇 | ニトロペン舌下錠0.3mg | 0.3mg1錠 |
| * | | 劇 | ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」 | 20mg1錠 |
| * | | 劇 | ニフェジピンCR錠40mg「NP」 | 40mg1錠 |
| * | | 劇 | ニフェジピンカプセル10mg「テバ」 | 10mg1カプセル |
| | | | ニフラス配合内用剤 | 1袋 |
| | | | ニフラン点眼液0.1% | 0.1%1mL |
| | | 劇 | ニュープロパッチ4.5mg | 4.5mg1枚 |
| | 要時 | 劇 | ニューモバックスNP | 0.5mL1瓶 |
| | | | ニューロライト第一 | 1回分 |
| | | | ニューロライト注射液第一 | 600MBq1筒 |
| * | 要時 | 毒 | ニンラーロカプセル2.3mg | 2.3mg1カプセル |
| * | 要時 | 毒 | ニンラーロカプセル3mg | 3mg1カプセル |
| * | 要時 | 毒 | ニンラーロカプセル4mg | 4mg1カプセル |
| | | 劇 | ヌーカラ皮下注100mgペン | 100mg1mL1キット |
| | | | ネオアミュー輸液 | 200mL1袋 |
| * | | 劇 | ネオオーラル10mgカプセル | 10mg1カプセル |
| * | | 劇 | ネオオーラル25mgカプセル | 25mg1カプセル |
| * | | 劇 | ネオオーラル50mgカプセル | 50mg1カプセル |
| | 製剤 | | ネオシネジンコーワ5%点眼液 | 5%1mL |
| | | 劇 | ネオシネジンコーワ注1mg | 0.1%1mL1管 |
| | | | ネオステリングリーンうがい液0.2% | 1mL |
| | | 劇 | ネオビタカイン注シリンジ5mL | 5mL1筒 |
| | | | ネオファーゲン静注20mL | 20mL1管 |
| | | | ネオフィリン錠100mg | 100mg1錠 |
| | | | ネオフィリン注250mg | 2.5%10mL1管 |
| | | | ネキシウムカプセル20mg | 20mg1カプセル |
| | 要時 | | ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg | 10mg1包 |
| | | 劇 | ネクサバル錠200mg | 200mg1錠 |
| | | | ネシーナ錠25mg | 25mg1錠 |
| | | 劇 | ネスプ注射液120μgプラシリンジ | 120μg0.5mL1筒 |
| | | 劇 | ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% | 0.1%1g |
| | | 劇 | ネリゾナ軟膏0.1% | 0.1%1g |
| | | 劇 | ネリプロクト坐剤 | 1個 |
| | 特生 | | ノイアート静注用1500単位 | 1,500単位1瓶(溶解液付) |
| | | | ノイキノン錠10mg | 10mg1錠 |
| * | | | ノイトロジン注100μg | 100μg1瓶(溶解液付) |
| * | | | ノイトロジン注250μg | 250μg1瓶(溶解液付) |
| | | | ノイロトロピン錠4単位 | 4単位1錠 |
| | | | ノイロトロピン注射液3.6単位 | 3mL1管 |
| | 要時 | | ノウリアスト錠20mg | 20mg1錠 |
| | | 劇・向3 | ノーベルパール静注用250mg | 250mg1瓶 |
| | | | ノバスタンHI注10mg/2mL | 10mg2mL1管 |
| | | | ノバミン筋注5mg | 0.5%1mL1管 |
| | | | ノバミン錠5mg | 5mg1錠 |
| | | 毒 | ノバントロン注10mg | 10mg5mL1瓶 |
| | | | ノボセブンHI静注用5mgシリンジ | 5mg5mL1瓶(溶解液付) |
| * | | 劇 | ノボラピッド30ミックス注フレックスペン | 300単位1キット |
| * | | 劇 | ノボラピッド注100単位/mL | 100単位1mLバイアル |
| * | | 劇 | ノボラピッド注フレックスタッチ | 300単位1キット |
| | | 劇 | ノボリンR注フレックスペン | 300単位1キット |
| | | 劇 | ノルアドリナリン注1mg | 0.1%1mL1管 |
| * | | | ノルディトロピンフレックスプロ注10mg | 10mg1キット |
| * | | | ノルディトロピンフレックスプロ注15mg | 15mg1キット |
| | | 劇 | パーゼタ点滴静注420mg/14mL | 420mg14mL1瓶 |
| * | | | ハーセプチン注射用150 | 150mg1瓶(溶解液付) |
| * | | | ハーセプチン注射用60 | 60mg1瓶(溶解液付) |
| | | 劇 | ハーフジゴキシンKY錠0.125 | 0.125mg1錠 |
| | | | バイアスピリン錠100mg | 100mg1錠 |
| | | 劇 | ハイカムテン注射用1.1mg | 1.1mg1瓶 |

| 複数規格 | 備考 | 規制 | 医薬品名 | 規格単位 |
|------|-------|----|------------------------------|-------------------|
| | | | ハイカリックRF輸液 | 500mL1袋 |
| | | | バイシリンG顆粒40万単位 | 40万単位1g |
| | | 劇 | ハイドレアカプセル500mg | 500mg1カプセル |
| | | | ハイポアルコール液2%「ヤクハン」 | 10mL |
| | | | ハイボン錠20mg | 20mg1錠 |
| | | 劇 | パキシルCR錠12.5mg | 12.5mg1錠 |
| | | 劇 | バクスマー一点鼻粉末剤3mg | 3mg1瓶 |
| | | | バクタ配合顆粒 | 1g |
| | | | バクトラミン注 | 5mL1管 |
| | | | バクトロバン鼻腔用軟膏2% | 2%1g |
| * | | 毒 | パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピ | 100mg16.7mL1瓶 |
| * | | 毒 | パクリタキセル点滴静注液30mg/5mL「ホスピーラ | 30mg5mL1瓶 |
| | | | パスタロンソフト軟膏10% | 10%1g |
| | | | ハッカ油「ケンエー」 | 1mL |
| | | 劇 | パナルジン細粒10% | 10%1g |
| | | | パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」 | 4%1mL1管 |
| | 要時・特生 | | ハプトグロビン静注2000単位「JB」 | 2,000単位100mL1瓶 |
| | | 劇 | バベンチオ点滴静注200mg | 200mg10mL1瓶 |
| | | | パム静注500mg | 2.5%20mL1管 |
| | | 毒 | ハラヴェン静注1mg | 1mg2mL1瓶 |
| | | 劇 | バラクルード錠0.5mg | 0.5mg1錠 |
| | | | バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」 | 500mg1包 |
| | | | バラシクロビル顆粒50%「アスペン」 | 50%1g |
| | 要時 | 劇 | パラミチンカプセル300mg | 300mg1カプセル |
| | | | パリエット錠10mg | 10mg1錠 |
| | | 毒 | バリキサ錠450mg | 450mg1錠 |
| | | | バルサルタンOD錠80mg「トーワ」 | 80mg1錠 |
| | | | バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」 | 5%1mL |
| | | | バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」 | 200mg1錠 |
| | | | パルミコート200μgタービューヘイラー56吸入 | 11.2mg1瓶(200μg) |
| | | | パルミコート吸入液0.25mg | 0.25mg2mL1管 |
| | | | パルモディア錠0.1mg | 0.1mg1錠 |
| | | | バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」 | 500mg1瓶 |
| | | | バンコマイシン点滴静注用0.5g「トーワ」 | 0.5g1瓶 |
| | | | パンテチン散20%「テバ」 | 20%1g |
| * | | | パントール注射液100mg | 100mg1管 |
| * | | | パントール注射液500mg | 500mg1管 |
| | | 劇 | ハンブ注射用1000 | 1,000μg1瓶 |
| | | 劇 | ビ・シフロール錠0.5mg | 0.5mg1錠 |
| | | | ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「テバ」 | 1%2.5mL1筒 |
| | | | ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」 | 0.1%5mL1瓶 |
| | | | ヒアレインミニ点眼液0.3% | 0.3%0.4mL1個 |
| | | | ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% | 0.46%20mL1瓶(希釈液付) |
| | | | ビーフリード輸液 | 500mL1キット |
| | | 劇 | ビームゲン注0.5mL | 0.5mL1瓶 |
| | | | ビオフェルミンR錠 | 1錠 |
| | | | ビオフェルミン配合散 | 1g |
| | | 劇 | ビカルタミド錠80mg「トーワ」 | 80mg1錠 |
| * | | | ビクシリン注射用0.25g | 250mg1瓶 |
| * | | | ビクシリン注射用0.5g | 500mg1瓶 |
| * | | | ビクシリン注射用1g | 1g1瓶 |
| | | 劇 | ビクトーザ皮下注18mg | 18mg3mL1キット |
| | | | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」 | 0.75%1mL |
| | | | ビジクリア配合錠 | 1錠 |
| * | | 劇 | ピシバニール注射用1KE | 1KE1瓶(溶解液付) |
| * | | 劇 | ピシバニール注射用5KE | 5KE1瓶(溶解液付) |
| | | | ビスコート0.5眼粘弾剤 | 0.5mL1筒 |
| | | | ビソノテープ4mg | 4mg1枚 |
| * | | | ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」 | 0.625mg1錠 |
| * | | | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」 | 2.5mg1錠 |
| | | 劇 | ビダーザ注射用100mg | 100mg1瓶 |
| | | | ビタジェクト注キット | 2筒1キット |

| 複数規格 | 備考 | 規制 | 医薬品名 | 規格単位 |
|------|-------|------|-------------------------|-----------------|
| | | | ビタシミン注射液500mg | 500mg1管 |
| | | | ビタミンB6散10%「マルイシ」 | 10%1g |
| | | | ビタメジン静注用 | 1瓶 |
| | | | ビタメジン配合カプセルB25 | 1カプセル |
| | | | ビダラビン軟膏3%「タイヨー」 | 3%1g |
| | 要時 | | ヒトCRH静注用100µg「タナベ」 | 100µg1瓶(溶解液付) |
| | | | ピドキサル錠10mg | 10mg1錠 |
| | | | ピトレシン注射液20 | 20単位1管 |
| * | | 劇 | ピノルビン注射用10mg | 10mg1瓶 |
| * | | 劇 | ピノルビン注射用20mg | 20mg1瓶 |
| | | | ピブラマイシン錠100mg | 100mg1錠 |
| * | | | ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」 | 1g1瓶 |
| * | | | ピペラシリンNa注射用2g「サワイ」 | 2g1瓶 |
| | | 劇 | ビムパット錠50mg | 50mg1錠 |
| | 要時 | 劇 | ビムパット点滴静注100mg | 100mg10mL1瓶 |
| | | | ピモベンダン錠2.5mg「TE」 | 2.5mg1錠 |
| | | | ヒューマトローブ注射用12mg | 12mg1筒(溶解液付) |
| * | | 劇 | ヒューマリン3/7注カート | 300単位1筒 |
| * | | 劇 | ヒューマリンN注カート | 300単位1筒 |
| * | | 劇 | ヒューマリンR注100単位/mL | 100単位1mLバイアル |
| * | | 劇 | ヒューマリンR注カート | 300単位1筒 |
| * | | 劇 | ヒューマログミックス50注ミリオペン | 300単位1キット |
| * | 要時 | 劇 | ヒューマログ注100単位/mL | 100単位1mLバイアル |
| * | | 劇 | ヒューマログ注カート | 300単位1筒 |
| | | 劇 | ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL | 40mg0.4mL1筒 |
| * | 要時 | 劇 | ビラフトビカプセル50mg | 50mg1カプセル |
| * | 要時 | 劇 | ビラフトビカプセル75mg | 75mg1カプセル |
| | | | ピラマイド原末 | 1g |
| * | 特生 | | ピリヴィジェン10%点滴静注20g/200mL | 20g200mL1瓶 |
| * | 特生 | | ピリヴィジェン10%点滴静注5g/50mL | 5g50mL1瓶 |
| | | | ピリスコピン点滴静注50 | 10.55%100mL1瓶 |
| | | 劇 | ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「日医工」 | 25mg1カプセル |
| * | | | ピルナミン錠(25mg) | 25mg1錠 |
| * | | | ピルナミン錠(5mg) | 5mg1錠 |
| | | 劇 | ピレスバ錠200mg | 200mg1錠 |
| | | | ピレチア錠(25mg) | 25mg1錠 |
| | | | ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」 | 0.005%5mL1瓶 |
| | | | ファーストシン静注用1g | 1g1瓶 |
| | 要時 | | ファミビル錠250mg | 250mg1錠 |
| * | | | ファミチジンD錠10mg「サワイ」 | 10mg1錠 |
| * | | | ファミチジンD錠20mg「サワイ」 | 20mg1錠 |
| | | | ファミチジン散10%「サワイ」 | 10%1g |
| | | | ファミチジン注用20mg「トーワ」 | 20mg1管 |
| | | 劇 | ファンガード点滴用75mg | 75mg1瓶 |
| | | 劇 | ファンギゾンシロップ100mg/mL | 100mg1mL |
| | | | フィコンパ錠2mg | 2mg1錠 |
| | | | フィジオ140輸液 | 500mL1袋 |
| | | | フィニボックス点滴静注用0.5g | 500mg1瓶 |
| | | 劇 | ブイフェンド200mg静注用 | 200mg1瓶 |
| | | | フィブラストスプレー500 | 500µg1瓶(溶解液付) |
| | 要時・特生 | | フィブリノゲンHT静注用1g「JB」 | 1g1瓶(溶解液付) |
| | 特生 | | フィプロガミンP静注用 | 240国際単位1瓶(溶解液付) |
| * | | | フィルグラスチムBS注150µgシリンジ「F」 | 150µg0.6mL1筒 |
| * | | | フィルグラスチムBS注300µgシリンジ「F」 | 300µg0.7mL1筒 |
| * | | | フィルグラスチムBS注75µgシリンジ「F」 | 75µg0.3mL1筒 |
| | | | プールシンチ注 | 10MBq |
| | | | フェジン静注40mg | 40mg2mL1管 |
| | | 劇 | フェソロデックス筋注250mg | 250mg5mL1筒 |
| | | | フェニアラニン除去ミルク配合散「雪印」 | 1g |
| | | | フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」 | 10g |
| | | 劇・向3 | フェノバル散10% | 10%1g |
| | | 劇・向3 | フェノバル注射液100mg | 10%1mL1管 |

| 複数規格 | 備考 | 規制 | 医薬品名 | 規格単位 |
|------|----|----|-----------------------------|------------------|
| | | | フェブリク錠10mg | 10mg1錠 |
| | | | フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 | 3%1g |
| | | | フェルビナクテープ70mg「EMEC」 | 10cm×14cm1枚 |
| | | | フェロ・グラデュメット錠105mg | 1錠 |
| | | | フェロベリン配合錠 | 1錠 |
| | 要時 | 劇 | フェロン注射用300万 | 300万国際単位1瓶(溶解液付) |
| * | | 麻劇 | フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」 | 4.2mg1枚 |
| * | 要時 | 麻劇 | フェンタニル3日用テープ8.4mg「HMT」 | 8.4mg1枚 |
| * | | 麻劇 | フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」 | 0.005%2mL1管 |
| * | | 麻劇 | フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」 | 0.005%10mL1管 |
| * | | 麻劇 | フェントステープ1mg | 1mg1枚 |
| * | | 麻劇 | フェントステープ2mg | 2mg1枚 |
| * | | 麻劇 | フェントステープ4mg | 4mg1枚 |
| * | 要時 | 麻劇 | フェントステープ8mg | 8mg1枚 |
| * | | | フォシーガ錠10mg | 10mg1錠 |
| * | | | フォシーガ錠5mg | 5mg1錠 |
| | | | フォリアミン錠 | 5mg1錠 |
| | 要時 | | フォルテオ皮下注キット600μg | 600μg1キット |
| | | 劇 | フシラミン錠50mg「日医工」 | 50mg1錠 |
| | | | フスコデ配合錠 | 1錠 |
| | | | ブスコパン錠10mg | 10mg1錠 |
| | | 劇 | ブスコパン注20mg | 2%1mL1管 |
| | | | フストジル注射液50mg | 2mL1管 |
| | | | ブドウ酒 | 10mL |
| | | | ブドウ糖*(扶桑) | 10g |
| * | | | プラザキサカプセル110mg | 110mg1カプセル |
| * | | | プラザキサカプセル75mg | 75mg1カプセル |
| | | | フラジール内服錠250mg | 250mg1錠 |
| | | | フラジール錠250mg | 250mg1錠 |
| | | | ブラダロン錠200mg | 200mg1錠 |
| | | | プラノバル配合錠 | 1錠 |
| | | | プラバスタチンNa錠10mg「ケミファ」 | 10mg1錠 |
| | | | フラビタン眼軟膏0.1% | 0.1%1g |
| | | | フラビタン錠5mg | 5mg1錠 |
| | | 劇 | プラリア皮下注60mgシリンジ | 60mg1mL1筒 |
| | | | プランルカストDS10%「トーワ」 | 10%1g |
| | | | プランルカストカプセル112.5mg「日医工」 | 112.5mg1カプセル |
| | | 劇 | プリジスタナイーブ錠800mg | 800mg1錠 |
| | | | プリズバインド静注液2.5g | 2.5g50mL1瓶 |
| | | | ブリディオ静注200mg | 200mg2mL1瓶 |
| | 要時 | | プリミドン細粒99.5%「日医工」 | 99.5%1g |
| | | | プリモボラン錠5mg | 5mg1錠 |
| | 要時 | | プリンタ錠60mg | 60mg1錠 |
| | | 劇 | プリンペラン細粒2% | 2%1g |
| | | | プリンペラン注射液10mg | 0.5%2mL1管 |
| | | | フルオレサイト静注500mg | 10%5mL1瓶 |
| | | | フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」 | 100mg1カプセル |
| | | | フルコナゾール静注液0.2%「F」 | 0.2%50mL1袋 |
| | | | フルタイド50μgエアゾール120吸入用 | 8.83mg10.6g1瓶 |
| | 要時 | 劇 | フルダラ静注用50mg | 50mg1瓶 |
| | | | フルティフォーム125エアゾール120吸入用 | 120吸入1瓶 |
| | | 向2 | フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 | 1mg1錠 |
| | | 劇 | フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」 | 0.5mg5mL1管 |
| | | | フルマリン静注用1g | 1g1瓶 |
| | | 劇 | フルメタ軟膏 | 0.1%1g |
| * | | | フルメトロン点眼液0.02% | 0.02%1mL |
| * | | | フルメトロン点眼液0.1% | 0.1%1mL |
| | | | プレアミン-P注射液 | 200mL1袋 |
| * | 要時 | 劇 | プレオ注射用15mg | 15mg1瓶 |
| * | 要時 | 劇 | プレオ注射用5mg | 5mg1瓶 |
| | | 劇 | プレグランディン腔坐剤1mg | 1mg1個 |
| | | 劇 | プレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ「ファ | 200μg50mL1筒 |

| 複数規格 | 備考 | 規制 | 医薬品名 | 規格単位 |
|------|----|----|------------------------------|-------------------|
| | | | プレディニン錠25 | 25mg1錠 |
| | | | プレドニゾロン散「タケダ」1% | 1%1g |
| | | | プレドニゾロン錠1mg(旭化成) | 1mg1錠 |
| | | | プレドニン錠5mg | 5mg1錠 |
| | | | プレドネマ注腸20mg | 20mg1個 |
| | 要時 | 劇 | プレバイミス錠240mg | 240mg1錠 |
| | | | プレマリン錠0.625mg | 0.625mg1錠 |
| | | | プレミネント配合錠LD | 1錠 |
| | | | プロイメンド点滴静注用150mg | 150mg1瓶 |
| * | | 劇 | プログラフカプセル0.5mg | 0.5mg1カプセル |
| * | | 劇 | プログラフカプセル1mg | 1mg1カプセル |
| | | 劇 | プログラフ注射液2mg | 2mg0.4mL1管 |
| | 要時 | 劇 | プログラフ顆粒0.2mg | 0.2mg1包 |
| | | | プロゲデポー筋注125mg | 125mg1管 |
| | | | プロジフ静注液400 | 8%5mL1瓶 |
| | | | プロスタール錠25 | 25mg1錠 |
| | | 劇 | プロスタルモン・F注射液1000 | 1mg1mL1管 |
| | | 劇 | プロスタンディン軟膏0.003% | 0.003%1g |
| | | | フロセミド細粒4%「EMEC」 | 4%1g |
| * | | | フロセミド錠20mg「武田テバ」 | 20mg1錠 |
| * | | | フロセミド錠40mg「武田テバ」 | 40mg1錠 |
| | | | フロセミド注20mg「トーワ」 | 20mg1管 |
| | | 劇 | プロタノールL注0.2mg | 0.02%1mL1管 |
| | | | プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」 | 1%10mLバイアル |
| | | 向3 | プロチゾラムOD錠0.25mg「アメル」 | 0.25mg1錠 |
| | | | プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」 | 0.5mg1管 |
| | | | プロテカジン錠10 | 10mg1錠 |
| | | 劇 | プロトピック軟膏0.1% | 0.1%1g |
| | | | プロナーゼMS | 20,000単位 |
| | | 劇 | プロノン錠150mg | 150mg1錠 |
| | | | プロピレングリコール*(丸石) | 10mL |
| | | | プロペト | 10g |
| | | 劇 | フロベン顆粒8% | 8%1g |
| * | | 劇 | プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」 | 1g100mL1瓶 |
| * | | 劇 | プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」 | 200mg20mL1管 |
| | | 向3 | ブロマゼパム錠2mg「サンド」 | 2mg1錠 |
| | | | ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 | 0.2%1mL |
| | | | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーワ」 | 4mg1錠 |
| | | | ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」 | 0.2%2mL1管 |
| | | | フロモックス小児用細粒100mg | 100mg1g |
| | | | フロリードゲル経口用2% | 2%1g |
| | | 劇 | フロリネフ錠0.1mg | 0.1mg1錠 |
| | | | ベイスンOD錠0.3 | 0.3mg1錠 |
| | | 劇 | ベクティビックス点滴静注100mg | 100mg5mL1瓶 |
| | | 毒 | ベクロニウム静注用4mg「F」 | 4mg1管(溶解液付) |
| | | 劇 | ベサコリン散5% | 5%1g |
| | | 劇 | ベサノイドカプセル10mg | 10mg1カプセル |
| | | | ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」 | 200mg1錠 |
| | | | ベシケアOD錠5mg | 5mg1錠 |
| | 製剤 | | ベストロン耳鼻科用1% | 10mg1mL(溶解後の液として) |
| | 製剤 | | ベストロン点眼用0.5% | 5mg1mL(溶解後の液として) |
| | | 向3 | ベタナミン錠10mg | 10mg1錠 |
| | | 劇 | ベタニス錠50mg | 50mg1錠 |
| | | | ベタメタゾン吉草酸エステルローション0.12%「イ | 0.12%1mL |
| | | 麻 | ベチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」 | 3.5%1mL1管 |
| | | 劇 | ベナンボックス注用300mg | 300mg1瓶 |
| | | 劇 | ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」 | 4mg1錠 |
| | | | ベネトリン吸入液0.5% | 0.5%1mL |
| | | | ベノキシール点眼液0.4% | 0.4%1mL |
| | | | ヘパティメージ注 | 10MBq |
| * | | | ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サワイ」 | 20,000単位1瓶 |
| * | | | ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「テ | 1,000単位10mL1筒 |

| 複数規格 | 備考 | 規制 | 医薬品名 | 規格単位 |
|------|----|----|----------------------------|----------------------|
| * | 要時 | | ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ | 5,000単位0.2mL1筒 |
| * | | | ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」 | 5,000単位5mL1管 |
| | | | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」 | 1g |
| | | 劇 | ペブリコール錠50mg | 50mg1錠 |
| | | | ペボタステンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」 | 10mg1錠 |
| | 要時 | 劇 | ペムリディ錠25mg | 25mg1錠 |
| | | 劇 | ペラサスLA錠60μg | 60μg1錠 |
| | | 劇 | ペラプロストNa錠20μg「テバ」 | 20μg1錠 |
| | | | ペリアクチンシロップ0.04% | 0.04%10mL |
| | | | ペリオフィール歯科用軟膏2% | 10mg0.5g1シリンジ |
| | | | ペリチーム配合顆粒 | 1g |
| | | 毒 | ベルケイド注射用3mg | 3mg1瓶 |
| | | 劇 | ベルゴリド錠250μg「ファイザー」 | 250μg1錠 |
| * | | 劇 | ペルジピン注射液10mg | 10mg10mL1管 |
| * | | 劇 | ペルジピン注射液2mg | 2mg2mL1管 |
| | | | ペルソムラ錠15mg | 15mg1錠 |
| | | 劇 | ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」 | 8mg1錠 |
| | | 向3 | ベンザリン細粒1% | 1%1g |
| | | 向3 | ベンザリン錠5 | 5mg1錠 |
| | | 劇 | ベンズブロマロン錠50mg「杏林」 | 50mg1錠 |
| | | | ペンタサ錠250mg | 250mg1錠 |
| | | | ペンタサ注腸1g | 1g1個 |
| | | | ペンタサ顆粒94% | 94%1g |
| | | 劇 | ペンレステーブ18mg | (18mg)30.5mm×50.0mm散 |
| | | | ボグリボースOD錠0.2mg「マイラン」 | 0.2mg1錠 |
| | | | ホスコH-15 | 10g |
| | | 劇 | ホストイン静注750mg | 750mg10mL1瓶 |
| | | | ホスホマイシンナトリウム静注用2g「日医工」 | 2g1瓶 |
| | | | ホスミシンドライシロップ400 | 400mg1g |
| | | | ホスミン錠500 | 500mg1錠 |
| | | | ボスミン外用液0.1% | 0.1%1mL |
| | | 劇 | ボスミン注1mg | 0.1%1mL1管 |
| | | | ホスレノールOD錠250mg | 250mg1錠 |
| | | 劇 | ポテリジオ点滴静注20mg | 20mg5mL1瓶 |
| | 要時 | 毒 | ポトックス注用50単位 | 50単位1瓶 |
| | | 劇 | ポナロン経口ゼリー35mg | 35mg1包 |
| | | 劇 | ポナロン錠5mg | 5mg1錠 |
| | | | ポビドンヨードガーグル7%「マイラン」 | 7%1mL |
| | | | ポビドンヨードゲル10%「明治」 | 10%10g |
| | | | ポビドンヨード液10%「メタル」 | 10%10mL |
| | 製剤 | | ポピヨドンスクラブ7.5% | 7.5%10mL |
| | | | ポピヨドン液10% | 10%10mL |
| * | 要時 | 毒 | ポマリストカプセル1mg | 1mg1カプセル |
| * | 要時 | 毒 | ポマリストカプセル2mg | 2mg1カプセル |
| * | 要時 | 毒 | ポマリストカプセル3mg | 3mg1カプセル |
| * | | 毒 | ポマリストカプセル4mg | 4mg1カプセル |
| | | | ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」 | 75mg1錠 |
| | | | ポララミン注5mg | 0.5%1mL1管 |
| | | | ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」 | 83.3%1g |
| * | | 劇 | ポリコナゾール錠200mg「トーワ」 | 200mg1錠 |
| * | | 劇 | ポリコナゾール錠50mg「トーワ」 | 50mg1錠 |
| | | | ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g | 20%25g1個 |
| | | 向3 | ホリゾン散1% | 1%1g |
| | | 向3 | ホリゾン錠2mg | 2mg1錠 |
| | | 向3 | ホリゾン注射液10mg | 10mg1管 |
| | 要時 | 劇 | ポリドカスクレロール1%注2mL | 1%2mL1管 |
| | | 劇 | ボルタレンSRカプセル37.5mg | 37.5mg1カプセル |
| | | | ボルタレンゲル1% | 1%1g |
| | | 劇 | ボルタレン錠25mg | 25mg1錠 |
| | | | ボルベン輸液6% | 6%500mL1袋 |
| | | 劇 | ボンアルファハイ軟膏20μg/g | 0.002%1g |
| | | | ポンタールカプセル250mg | 250mg1カプセル |

| 複数規格 | 備考 | 規制 | 医薬品名 | 規格単位 |
|------|----|----|---------------------------|----------------------|
| * | | 劇 | マーカイン注脊麻用0.5%高比重 | 0.5%4mL1管 |
| * | | 劇 | マーカイン注脊麻用0.5%等比重 | 0.5%4mL1管 |
| | | 劇 | マイオザイム点滴静注用50mg | 50mg1瓶 |
| | | | マイオビュー「注射用」 | 1回分 |
| * | | 毒 | マイトマイシン注用10mg | 10mg1瓶 |
| * | | 劇 | マイトマイシン注用2mg | 2mg1瓶 |
| | | 劇 | マキサカルシトール静注透析用5μg「テバ」 | 5μg1mL1管 |
| | | | マキュエイド眼注用40mg | 40mg1瓶 |
| | | | マグコロール散68%分包50g | 68%50g1包 |
| | | | マグセント注100mL | 100mL1瓶 |
| | | | マグテクト配合内服液 | 10mL |
| | 製剤 | | マスキンW・エタノール液(0.5w/v%) | 0.5%10mL |
| | 要時 | 劇 | マブキャンバス点滴静注30mg | 30mg1mL1瓶 |
| | | | マリゼブ錠25mg | 25mg1錠 |
| | | | マンニトールS注射液 | 300mL1瓶 |
| | 要時 | | ミオMIBG-I123注射液 | 10MBq |
| | | 劇 | ミオコールスプレー0.3mg | 0.65%7.2g1缶 |
| | | | ミケラン点眼液2% | 2%1mL |
| | | 向3 | ミダゾラム注射液10mg「テバ」 | 10mg2mL1管 |
| | | 向3 | ミダフレッサ静注0.1% | 10mg10mL1瓶 |
| * | | | ミッドペリック250腹膜透析液 | 1.5L1袋(排液用バッグ付) |
| * | | | ミッドペリック250腹膜透析液 | 2L1袋(排液用バッグ付) |
| | 製剤 | | ミドリンM点眼液0.4% | 0.4%1mL |
| | | | ミドリンP点眼液 | 1mL |
| * | | 劇 | ミニリンメルトOD錠120μg | 120μg1錠 |
| * | | 劇 | ミニリンメルトOD錠60μg | 60μg1錠 |
| | | | ミネプロ錠2.5mg | 2.5mg1錠 |
| | | | ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」 | 100mg1瓶 |
| | | | ミノマイシンカプセル100mg | 100mg1カプセル |
| | | | ミヤBM錠 | 1錠 |
| * | | | ミラクリッド注射液10万単位 | 100,000単位2mL1管 |
| * | | | ミラクリッド注射液5万単位 | 50,000単位1mL1管 |
| | | 劇 | ミラペックスLA錠1.5mg | 1.5mg1錠 |
| | | 劇 | ミリステープ5mg | (5mg)4.05cm×4.50cm1枚 |
| | | 劇 | ミリスロール注1mg/2mL | 1mg2mL1管 |
| * | | 劇 | ミルセラ注シリンジ100μg | 100μg0.3mL1筒 |
| * | | 劇 | ミルセラ注シリンジ25μg | 25μg0.3mL1筒 |
| * | | 劇 | ミルセラ注シリンジ50μg | 50μg0.3mL1筒 |
| | | 劇 | ミルリノン注10mg「タカタ」 | 10mg10mL1管 |
| | 製剤 | | ミンクリア内用散布液0.8% | 20mL1筒 |
| | | | ムコサールドライシロップ1.5% | 1.5%1g |
| | | | ムコサール錠15mg | 15mg1錠 |
| | | 向3 | メイラックス錠2mg | 2mg1錠 |
| * | | | メイロン静注7% | 7%20mL1管 |
| * | | | メイロン静注7% | 7%250mL1袋 |
| * | | 劇 | メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」 | 100mg1カプセル |
| * | | 劇 | メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「日医工」 | 50mg1カプセル |
| | 要時 | 劇 | メクトビ錠15mg | 15mg1錠 |
| | | | メコバラミン錠500「トーワ」 | 0.5mg1錠 |
| * | | 麻劇 | メサペイン錠10mg | 10mg1錠 |
| * | | 麻劇 | メサペイン錠5mg | 5mg1錠 |
| | | 劇 | メスチノン錠60mg | 60mg1錠 |
| | | 劇 | メソトレキセート錠2.5mg | 2.5mg1錠 |
| * | | 劇 | メソトレキセート点滴静注液1000mg | 1,000mg40mL1瓶 |
| * | | 劇 | メソトレキセート点滴静注液200mg | 200mg8mL1瓶 |
| | | | メチコバル注射液500μg | 0.5mg1管 |
| | | 劇 | メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」 | 0.125mg1錠 |
| | | 劇 | メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」 | 0.02%1mL1管 |
| | | 劇 | メトグルコ錠250mg | 250mg1錠 |
| | | | メトクロプラミド錠5mg「テバ」 | 5mg1錠 |
| | | 劇 | メトトレキセート錠2mg「あゆみ」 | 2mg1錠 |
| | | | メトリジン錠2mg | 2mg1錠 |

| 複数規格 | 備考 | 規制 | 医薬品名 | 規格単位 |
|------|----|----|-----------------------|---------------------|
| | | | メドレニック注シリンジ | 2mL1筒 |
| | | | メドロール錠4mg | 4mg1錠 |
| | | | メナテレノンカプセル15mg「トーワ」 | 15mg1カプセル |
| | | | メネシット配合錠100 | 1錠 |
| | | | メブチンエア-10µg吸入100回 | 0.0143%5mL1キット |
| | | | メブチンシロップ5µg/mL | 0.0005%1mL |
| | | | メブチンドライシロップ0.005% | 0.005%1g |
| | | | メブチンミニ錠25µg | 0.025mg1錠 |
| | | | メブチン吸入液ユニット0.3mL | 0.01%0.3mL1個 |
| | | 劇 | メマリーOD錠5mg | 5mg1錠 |
| | | | メリスロン錠6mg | 6mg1錠 |
| | | | メルカゾール錠5mg | 5mg1錠 |
| | | | メロペナム点滴静注用0.5g「トーワ」 | 500mg1瓶 |
| | | | メンタックス外用液1% | 1%1mL |
| | 要時 | 劇 | モゾビル皮下注24mg | 24mg1.2mL1瓶 |
| | | | モビコール配合内用剤 | 6.8523g1包 |
| | | | モビプレップ配合内用剤 | 1袋 |
| | | 麻毒 | モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末 | 1g |
| * | | 麻劇 | モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」 | 1%1mL1管 |
| * | | 麻劇 | モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」 | 1%5mL1管 |
| | 要時 | 劇 | ヤーボイ点滴静注液50mg | 50mg10mL1瓶 |
| | | 劇 | ユーエフティE配合顆粒T150 | 150mg1包(テガフル相当量) |
| | | 劇 | ユーエフティ配合カプセルT100 | 100mg1カプセル(テガフル相当量) |
| | | | ユーゼル錠25mg | 25mg1錠 |
| | | | ユービット錠100mg | 100mg1錠 |
| | | | ユナシン細粒小児用10% | 100mg1g |
| | | | ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g | 4g1瓶 |
| | | | ユベランNカプセル100mg | 100mg1カプセル |
| | | 劇 | ヨウ化カリウム「ホエイ」 | 1g |
| | | | ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」 | 50mg1丸 |
| * | | | ヨウ化ナトリウムカプセル-1号 | 37MBq1カプセル |
| * | | | ヨウ化ナトリウムカプセル-30号 | 1,110MBq1カプセル |
| * | | | ヨウ化ナトリウムカプセル-3号 | 111MBq1カプセル |
| * | | | ヨウ化ナトリウムカプセル-50号 | 1,850MBq1カプセル |
| * | | | ヨウ化ナトリウムカプセル-5号 | 185MBq1カプセル |
| | | | ヨードカプセル-123 | 3.7MBq1カプセル |
| | | | ヨクイニンエキス錠「コタロー」 | 1錠 |
| | | 劇 | ライゾデグ配合注フレックスタッチ | 300単位1キット |
| | | | ラクツロースシロップ65%「タカタ」 | 65%1mL |
| | | | ラクテック注 | 500mL1袋 |
| | | | ラコールNF配合経腸用液 | 10mL |
| | | | ラコールNF配合経腸用半固形剤 | 10g |
| | | | ラジカット点滴静注バッグ30mg | 30mg100mL1キット |
| | 要時 | | ラジレス錠150mg | 150mg1錠 |
| | | 劇 | ラスリテック点滴静注用7.5mg | 7.5mg1瓶(溶解液付) |
| | | | ラタノプロスト点眼液0.005%「TS」 | 0.005%1mL |
| | | | ラックビー微粒N | 1%1g |
| | | 劇 | ラニラピッド錠0.05mg | 0.05mg1錠 |
| | | | ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg | 300mg60mL1袋 |
| | 要時 | 劇 | ラビピュール筋注用 | 1瓶(溶解液付) |
| | | 劇 | ラミクター錠25mg | 25mg1錠 |
| | | | ラミシールクリーム1% | 1%1g |
| | | | ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」 | 15mg1錠 |
| * | | 劇 | ランタスXR注シロスター | 450単位1キット |
| * | | 劇 | ランタス注100単位/mL | 100単位1mLバイアル |
| | | 劇 | ランマーク皮下注120mg | 120mg1.7mL1瓶 |
| | | | リアルダ錠1200mg | 1,200mg1錠 |
| | | | リーバクト配合顆粒 | 4.15g1包 |
| | | 劇 | リーマス錠200 | 200mg1錠 |
| | | | リオナ錠250mg | 250mg1錠 |
| | | 劇 | リオレサル錠5mg | 5mg1錠 |
| * | | | リクシアナOD錠30mg | 30mg1錠 |

| 複数規格 | 備考 | 規制 | 医薬品名 | 規格単位 |
|------|----|------|--------------------------|-----------------|
| * | | | リクシアナOD錠60mg | 60mg1錠 |
| | | 劇 | リクラスト点滴静注液5mg | 5mg100mL1瓶 |
| | | | リコモジュリン点滴静注用12800 | 12,800単位1瓶 |
| | | | リザベン細粒10% | 10%1g |
| | | 劇 | リスペリドンOD錠1mg「トーワ」 | 1mg1錠 |
| | | 劇 | リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」 | 0.1%1mL |
| | | | リズミック錠10mg | 10mg1錠 |
| | | 劇 | リスモダンP静注50mg | 50mg5mL1管 |
| | | 劇 | リスモダンカプセル100mg | 100mg1カプセル |
| | | | リゾビスト注 | 44.6mg1.6mL1瓶 |
| | | 劇・向1 | リタリン錠10mg | 10mg1錠 |
| * | | | リツキサン点滴静注100mg | 100mg10mL1瓶 |
| * | | | リツキサン点滴静注500mg | 500mg50mL1瓶 |
| * | | | リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 | 100mg10mL1瓶 |
| * | | | リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 | 500mg50mL1瓶 |
| * | | 劇 | リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」 | 2%5mL1筒 |
| * | | 劇 | リドカイン点滴静注液1%「タカタ」 | 1%200mL1袋 |
| | | | リトドリン塩酸塩錠5mg「日医工」 | 5mg1錠 |
| | | 劇 | リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「F」 | 1%5mL1管 |
| | | | リドメックスコーワクリーム0.3% | 0.3%1g |
| | | | リネゾリド点滴静注600mg/300mL「HK」 | 600mg300mL1袋 |
| | | | リパクレオンカプセル150mg | 150mg1カプセル |
| | | 劇 | リバスタッチパッチ18mg | 18mg1枚 |
| | | | リバロOD錠2mg | 2mg1錠 |
| | | | リビオドール480注10mL | 10mL1管 |
| | | | リファジンカプセル150mg | 150mg1カプセル |
| | | 劇 | リフレックス錠15mg | 15mg1錠 |
| | | | リボスチン点眼液0.025% | 0.025%1mL |
| | | 向3 | リボトリール細粒0.1% | 0.1%1g |
| | | 向3 | リボトリール錠0.5mg | 0.5mg1錠 |
| | | | リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 | 5μg1錠 |
| * | 要時 | 劇 | リュープリンPRO注射用キット22.5mg | 22.5mg1筒 |
| * | | 劇 | リュープリンSR注射用キット11.25mg | 11.25mg1筒 |
| * | | 劇 | リュープリン注射用1.88mg | 1.88mg1瓶(懸濁用液付) |
| * | | 劇 | リュープリン注射用3.75mg | 3.75mg1瓶(懸濁用液付) |
| * | | | リリカOD錠25mg | 25mg1錠 |
| * | | | リリカOD錠75mg | 75mg1錠 |
| | 要時 | | リレンザ | 5mg1プリスター |
| | 要時 | | リンゼス錠0.25mg | 0.25mg1錠 |
| | | | リンデロン-V軟膏0.12% | 0.12%1g |
| | | | リンデロン錠0.5mg | 0.5mg1錠 |
| | | | リンデロン注4mg(0.4%) | 4mg1管 |
| | | | リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% | 0.1%1mL |
| | | | リン酸Na補正液0.5mmol/mL | 0.5モル20mL1管 |
| | | 劇 | ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL | 0.5mg0.05mL1筒 |
| | | | ルネスタ錠2mg | 2mg1錠 |
| | | | ルブラック錠8mg | 8mg1錠 |
| | | 劇 | レキップCR錠2mg | 2mg1錠 |
| * | | | レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 | 1.5L1袋(排液用バッグ付) |
| * | | | レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 | 2L1袋(排液用バッグ付) |
| * | | | レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 | 1.5L1袋(排液用バッグ付) |
| * | | | レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 | 2L1袋(排液用バッグ付) |
| | | 劇 | レクサプロ錠10mg | 10mg1錠 |
| | 要時 | | レクチゾール錠25mg | 25mg1錠 |
| | | | レスキュラ点眼液0.12% | 0.12%1mL |
| | | | レスタミンコーワクリーム1% | 1%10g |
| | | | レスタミンコーワ錠10mg | 10mg1錠 |
| | | | レスピア静注・経口液60mg | 60mg3mL1瓶 |
| | | | レナジェル錠250mg | 250mg1錠 |
| | | | レナデックス錠4mg | 4mg1錠 |
| | | | レバーサ皮下注140mgペン | 140mg1mL1キット |
| | | | レバチオ錠20mg | 20mg1錠 |

| 複数規格 | 備考 | 規制 | 医薬品名 | 規格単位 |
|------|----|------|----------------------------------|---------------------------|
| | | | レバミビド錠100mg「オーツカ」 | 100mg1錠 |
| | | 毒 | レブラミドカプセル5mg | 5mg1カプセル |
| | | 劇・向2 | レペタン坐剤0.2mg | 0.2mg1個 |
| | | 劇・向2 | レペタン注0.2mg | 0.2mg1管 |
| | | 劇 | レベミル注フレックスペン | 300単位1キット |
| | | | レボフロキサシン錠250mg「DSEP」 | 250mg1錠(レボフロキサシンとして) |
| | | | レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」 | 500mg100mL1キット |
| | | | レボフロキサシン内用液250mg「トーワ」 | 250mg10mL1包(レボフロキサシンとして) |
| * | | | レボホリナート点滴静注用100mg「NP」 | 100mg1瓶 |
| * | | | レボホリナート点滴静注用25mg「NP」 | 25mg1瓶 |
| | 要時 | 劇 | レボレード錠12.5mg | 12.5mg1錠 |
| | | 劇 | レミッチOD錠2.5µg | 2.5µg1錠 |
| | | 劇 | レミニールOD錠4mg | 4mg1錠 |
| | 要時 | | レルベア100エリプタ30吸入用 | 30吸入1キット |
| | | | レルベア200エリプタ30吸入用 | 30吸入1キット |
| * | 要時 | 劇 | レンビマカプセル10mg | 10mg1カプセル |
| * | 要時 | 劇 | レンビマカプセル4mg | 4mg1カプセル |
| | | 劇 | ロイケリン散10% | 10%1g |
| | | | ロイコポリン注3mg | 0.3%1mL1管 |
| | | 劇 | ロイナーゼ注用5000 | 5,000K単位1瓶 |
| | | 劇 | ロートエキス散「ニッコー」 | 1g |
| | | 劇 | ロカイン注2% | 2%2mL1管 |
| | | | ロキソプロフェンNaパップ100mg「NP」 | 10cm×14cm1枚 |
| | | | ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」 | 60mg1錠 |
| | | 劇 | ロコアテープ | 10cm×14cm1枚 |
| | | | ロコイドクリーム0.1% | 0.1%1g |
| | | | ロコイド軟膏0.1% | 0.1%1g |
| | | | ロサルタンK錠50mg「トーワ」 | 50mg1錠 |
| | | | ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 | 2.5mg1錠 |
| | | 毒 | ロゼウス静注液40mg | 40mg4mL1瓶 |
| | | | ロゼレム錠8mg | 8mg1錠 |
| | | | ロトリガ粒状カプセル2g | 2g1包 |
| | | 劇 | ロピオン静注50mg | 50mg5mL1管 |
| | | | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 | 1mg1カプセル |
| | | | ロミプレート皮下注250µg調製用 | 250µg1瓶 |
| | | 向3 | ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 | 0.5mg1錠 |
| * | | 劇 | ロンサーフ配合錠T15 | 15mg1錠(トリフルリジン相当量) |
| * | | 劇 | ロンサーフ配合錠T20 | 20mg1錠(トリフルリジン相当量) |
| | | | ワーファリン錠1mg | 1mg1錠 |
| | | 劇 | ワゴスチグミン注0.5mg | 0.05%1mL1管 |
| * | | 劇・向3 | ワコビタール坐剤100 | 100mg1個 |
| * | | 劇・向3 | ワコビタール坐剤15 | 15mg1個 |
| * | | 劇・向3 | ワコビタール坐剤30 | 30mg1個 |
| * | | 劇・向3 | ワコビタール坐剤50 | 50mg1個 |
| | | | ワソラン錠40mg | 40mg1錠 |
| | | 劇 | ワソラン静注5mg | 0.25%2mL1管 |
| | | 劇 | ワントラム錠100mg | 100mg1錠 |
| | | 劇 | エフェドリン「ナガキ」注射液40mg | 4%1mL1管 |
| | | | 亜鉛華デンプン「コザカイ・M」 | 10g |
| | | 劇 | 亜硝酸アミル「AFP」 | 0.25mL1管 |
| | | | 一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」 | 20mg1錠 |
| | | 劇 | 一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 | (一般診断用・1人用)0.25µg1瓶(溶解液付) |
| | | | 塩化カリウム「日医工」 | 10g |
| | | | 塩化カリウム徐放錠600mg「St」 | 600mg1錠 |
| | | | 塩化タリウム-TI201注射液 | 10MBq |
| | | | 塩化ナトリウム「オーツカ」 | 10g |
| | | | 塩酸プロピペリン錠10mg「SW」 | 10mg1錠 |
| * | 特生 | | 乾燥HBグロブリン筋注用1000単位「ニチャク」 | 1,000単位5mL1瓶(溶解液付) |
| * | 特生 | | 乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチャク」 | 200単位1mL1瓶(溶解液付) |
| | | 劇 | 乾燥まむし抗毒素「KMB」 | 各6,000単位入1瓶(溶解液付) |
| | | 劇 | 冠動注用ミスロール0.5mg/10mL | 0.5mg10mL1管 |
| | | | 眼・耳科用リンデロンA軟膏 | 1g |

| 複数規格 | 備考 | 規制 | 医薬品名 | 規格単位 |
|------|-------|----|----------------------------|-------------------|
| | | | 眼科用ゼルフィルム | 2.5cm×5cm1枚 |
| | | | 希塩酸「ケンエー」 | 10mL |
| | | | 強力ポステリザン(軟膏) | 1g |
| | | | 経口用トロンピン細粒1万単位「サワイ」 | 10,000単位1g1包 |
| * | 特生 | | 献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」 | 5%250mL1瓶 |
| * | 特生 | | 献血アルブミン5%静注5g/100mL「JB」 | 5%100mL1瓶 |
| * | 特生 | | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL | 500mg5mL1瓶 |
| * | 特生 | | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL | 10g100mL1瓶 |
| * | 特生 | | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL | 2.5g25mL1瓶 |
| * | 特生 | | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注20g/200mL | 20g200mL1瓶 |
| * | 特生 | | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL | 5g50mL1瓶 |
| * | 要時・特生 | | 献血グロベニン-I静注用2500mg | 2.5g50mL1瓶(溶解液付) |
| * | 要時・特生 | | 献血グロベニン-I静注用5000mg | 5g100mL1瓶(溶解液付) |
| * | 要時・特生 | | 献血ベニロン-I静注用2500mg | 2.5g50mL1瓶(溶解液付) |
| * | 要時・特生 | | 献血ベニロン-I静注用5000mg | 5g100mL1瓶(溶解液付) |
| * | 要時・特生 | | 献血ベニロン-I静注用500mg | 500mg10mL1瓶(溶解液付) |
| * | 要時・特生 | | 献血ポリグロビンN10%静注2.5g/25mL | 2.5g25mL1瓶 |
| * | 特生 | | 献血ポリグロビンN10%静注5g/50mL | 5g50mL1瓶 |
| * | | | 光糖液20% | 20%500mL1袋 |
| * | | | 光糖液5% | 5%50mL1瓶 |
| | 特生 | | 抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」 | 1,000倍1瓶(溶解液付) |
| | | | 産婦人科用イソジンクリーム5% | 5%10g |
| * | | | 酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」 | 250mg1錠 |
| * | | | 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」 | 330mg1錠 |
| | | | 酸化亜鉛*(山善) | 10g |
| | | 劇 | 歯科用キシロカインカートリッジ | 1.8mL1管 |
| | | 劇 | 歯科用シタネスト-オクタプレシンカートリッジ | 1.8mL1管 |
| | | | 重質酸化マグネシウム「ケンエー」 | 10g |
| | | | 小児用ムコソルバンシロップ0.3% | 0.3%1mL |
| | | | 消毒用エタノール「ヤクハン」 | 10mL |
| | | | 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 | 40mg1枚 |
| | | | 硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」 | 20mg1カプセル |
| | | | 硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」 | 0.05%10mL1管 |
| | | | 新レシカルボン坐剤 | 1個 |
| | | | 診断用アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」 | 1mL1瓶 |
| | | | 人工涙液マイティア点眼液 | 5mL1瓶 |
| | | | 酢酸「ニッコー」 | 10mL |
| | | | 水溶性ハイドロコートン注射液100mg | 100mg2mL1瓶 |
| * | | | 水溶性プレドニン10mg | 10mg1管 |
| * | | | 水溶性プレドニン20mg | 20mg1管 |
| * | | | 生食注シリンジ「NP」 | 20mL1筒 |
| * | | | 生食注シリンジ「SN」10mL | 10mL1筒 |
| * | | | 生理食塩液「ヒカリ」 | 500mL1袋 |
| * | | | 生理食塩液「マイラン」 | 100mL1瓶 |
| * | | | 生理食塩液PL「フソー」 | 2L1袋 |
| * | | | 生理食塩液バッグ「フソー」 | 1.5L1袋 |
| | | | 精製水 | 10mL |
| | | 劇 | 静注用キシロカイン2% | 2%5mL1管 |
| * | | 劇 | 静注用フローラン0.5mg | 0.5mg1瓶 |
| * | 要時 | 劇 | 静注用フローラン1.5mg | 1.5mg1瓶 |
| | 要時 | | 静注用フローラン専用溶解液 | 50mL1瓶 |
| | | | 大塚塩カル注2% | 2%20mL1管 |
| * | | | 大塚蒸留水 | 100mL1瓶 |
| * | | | 大塚蒸留水 | 20mL1管 |
| * | | | 大塚蒸留水 | 500mL1瓶 |
| | | | 大塚食塩注10% | 10%20mL1管 |
| * | | | 大塚生食注 | 100mL1瓶 |
| * | | | 大塚生食注 | 20mL1管 |
| * | | | 大塚生食注 | 250mL1瓶 |
| * | | | 大塚生食注 | 250mL1袋 |
| * | | | 大塚生食注 | 500mL1瓶 |
| * | | | 大塚生食注 | 50mL1瓶 |

| 複数規格 | 備考 | 規制 | 医薬品名 | 規格単位 |
|------|----|----|------------------------|---------------|
| * | | | 大塚生食注2ポート100mL | 100mL1キット |
| * | | | 大塚糖液10% | 10%20mL1管 |
| * | | | 大塚糖液10% | 10%500mL1袋 |
| * | | | 大塚糖液20% | 20%20mL1管 |
| * | | | 大塚糖液40% | 40%20mL1管 |
| * | | | 大塚糖液5% | 5%100mL1瓶 |
| * | | | 大塚糖液5% | 5%20mL1管 |
| * | | | 大塚糖液5% | 5%250mL1瓶 |
| * | | | 大塚糖液5% | 5%500mL1袋 |
| * | | | 大塚糖液50% | 50%20mL1管 |
| * | | | 大塚糖液50% | 50%500mL1袋 |
| | | | 単シロップ | 10mL |
| | | | 炭酸水素ナトリウム | 10g |
| | 要時 | | 注射用GHRP科研100 | 100µg1瓶(溶解液付) |
| | | 劇 | 注射用イホマイド1g | 1g1瓶 |
| | | | 注射用エラスポール100 | 100mg1瓶 |
| * | | 劇 | 注射用エンドキサン100mg | 100mg1瓶 |
| * | | 劇 | 注射用エンドキサン500mg | 500mg1瓶 |
| * | | 劇 | 注射用サイメリン100mg | 100mg1瓶 |
| * | | 劇 | 注射用サイメリン50mg | 50mg1瓶 |
| * | | | 注射用ソル・メルコート1,000 | 1g1瓶(溶解液付) |
| * | | | 注射用ソル・メルコート500 | 500mg1瓶(溶解液付) |
| * | | 劇 | 注射用フィルデシン1mg | 1mg1瓶 |
| * | | 劇 | 注射用フィルデシン3mg | 3mg1瓶 |
| | | | 注射用ペニシリンGカリウム100万単位 | 100万単位1瓶 |
| | | | 注射用マキシーム1g | 1g1瓶 |
| * | | 劇 | 注射用メソトレキセート50mg | 50mg1瓶 |
| * | | 劇 | 注射用メソトレキセート5mg | 5mg1瓶 |
| | | | 調剤用バンビタン末 | 1g |
| | | | 沈降炭酸カルシウム錠500mg「武田テバ」 | 500mg1錠 |
| | | 劇 | 沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」 | 0.5mL1筒 |
| | | | 点眼・点鼻用リンデロンA液 | 1mL |
| | | 毒 | 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL | 6g250mL1瓶 |
| * | | 毒 | 動注用アイエーコール100mg | 100mg1瓶 |
| * | | 毒 | 動注用アイエーコール50mg | 50mg1瓶 |
| | 製剤 | 劇 | 日点アトロピン点眼液1% | 1%5mL1瓶 |
| | | | 乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」 | 10g |
| | | | 乳糖「ホエイ」 | 10g |
| | | | 無水エタノール注「ファイザー」 | 5mL1管 |
| | | | 滅菌精製水「ヨシダ」 | 10mL |
| | | | 薬用炭「日医工」 | 1g |
| | | | 流動パラフィン「マルイシ」 | 10mL |
| | | | 硫酸Mg補正液1mEq/mL | 0.5モル20mL1管 |
| | 要時 | 毒 | 硫酸アトロピン「ホエイ」 | 1g |
| | | | 硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」 | 1g1瓶 |
| | | | 硫酸ポリミキシンB散50万単位「ファイザー」 | 50万単位1瓶 |
| | 要時 | | 腓外分泌機能検査用PFD内服液500mg | 5%10mL1瓶 |

当院採用抗菌薬一覧

岡山医療センター薬剤部
R2.4現在

セフェム系第1世代

| 製品名 | 一般名 | 規格単位 | 剤型 | 略号 |
|----------------------|---------------|------------|----|-----|
| ケフラルカプセル250mg | セファクロル | 250mg1カプセル | 内服 | CCL |
| ケフラル細粒小児用100mg | セファクロル | 100mg1g | 内服 | CCL |
| セフトリアキソンナトリウム注射液0.5g | セフトリアキソンナトリウム | 500mg1瓶 | 注射 | CEZ |
| セフトリアキソンナトリウム注射液1g | セフトリアキソンナトリウム | 1g1瓶 | 注射 | CEZ |
| セフトリアキソンナトリウム注射液2g | セフトリアキソンナトリウム | 2g1瓶 | 注射 | CEZ |

セフェム系第2世代

| 製品名 | 一般名 | 規格単位 | 剤型 | 略号 |
|----------------------|---------------|---------|----|------|
| セフトリアキソンナトリウム注射液0.5g | セフトリアキソンナトリウム | 500mg1瓶 | 注射 | CTM |
| セフトリアキソンナトリウム注射液1g | セフトリアキソンナトリウム | 1g1瓶 | 注射 | CTM |
| セフトリアキソンナトリウム注射液1g | セフトリアキソンナトリウム | 1g1瓶 | 注射 | CMZ |
| フルマリン注射液1g | フロモキシムナトリウム | 1g1瓶 | 注射 | FMOX |

セフェム系第3世代

| 製品名 | 一般名 | 規格単位 | 剤型 | 略号 |
|----------------------|-----------------|------------|----|---------|
| セフトリアキソンナトリウム注射液1g | スルバクタム・セフトリアキソン | 1g1瓶 | 注射 | SBT/CPZ |
| セフトリアキソンナトリウム錠100mg | セフトリアキソンナトリウム | 100mg1錠 | 内服 | CFPN-PI |
| セフトリアキソンナトリウム注射液1g | セフトリアキソンナトリウム | 1g1瓶 | 注射 | CTX |
| セフトリアキソンナトリウム注射液0.5g | セフトリアキソンナトリウム | 0.5g1瓶 | 注射 | CTX |
| セフトリアキソンナトリウム注射液10% | セフトリアキソンナトリウム | 100mg1g | 内服 | CDTR-PI |
| セフトリアキソンナトリウム錠100mg | セフトリアキソンナトリウム | 100mg1カプセル | 内服 | CFDN |
| セフトリアキソンナトリウム錠小児用 | セフトリアキソンナトリウム | 100mg1g | 内服 | CFDN |
| セフトリアキソンナトリウム注射液0.5g | セフトリアキソンナトリウム | 500mg1瓶 | 注射 | CAZ |
| セフトリアキソンナトリウム注射液1g | セフトリアキソンナトリウム | 1g1瓶 | 注射 | CAZ |
| セフトリアキソンナトリウム注射液 | セフトリアキソンナトリウム | 1g1瓶 | 注射 | CTR-X |
| セフトリアキソンナトリウム注射液 | セフトリアキソンナトリウム | 100mg1錠 | 内服 | CPDX-PR |
| フロモックス小児用細粒100mg | セフトリアキソンナトリウム | 100mg1g | 内服 | CFPN-PI |
| バスターオン耳鼻科用 | セフトリアキソンナトリウム | 1%50mL1瓶 | 外用 | CMX |
| バスターオン点眼用 | セフトリアキソンナトリウム | 0.5%5mL1瓶 | 外用 | CMX |

セフェム系第4世代

| 製品名 | 一般名 | 規格単位 | 剤型 | 略号 |
|--------------|---------------|------|----|------|
| 注射用マキシム1g | セフトリアキソンナトリウム | 1g1瓶 | 注射 | CFPM |
| ファーストシム注射液1g | セフトリアキソンナトリウム | 1g1瓶 | 注射 | CZOP |

当院採用抗菌薬一覧

ペニシリン系

| 製品名 | 一般名 | 規格単位 | 剤型 | 略号 |
|---------------------|-------------------------|------------|----|----------|
| アモキシシリンカプセル250mg | アモキシシリン | 250mg1カプセル | 内服 | AMPC |
| オーグメンチン配合錠 | クラブラン酸カリウム/アモキシシリン | 250RS | 内服 | AMPC/GVA |
| サワシリン細粒 | アモキシシリン | 100mg1g | 内服 | AMPC |
| スルバシリン静注用1.5g | スルバクタム・アンプシリン | (1.5g)1瓶 | 注射 | SBT/ABPC |
| タゾピ配合静注用4.5g | タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム | (4.5g)1瓶 | 注射 | TAZ/PIPC |
| バイシリンG顆粒 | ベンジルペニシリンベンザチン水和物 | 40万単位1g | 内服 | DBECPG |
| ピペラシリンナトリウム注射用1g | ピペラシリンナトリウム | 1g1瓶 | 注射 | PIPC |
| ピペラシリンナトリウム注射用2g | ピペラシリンナトリウム | 2g1瓶 | 注射 | PIPC |
| ユナシン細粒小児用 | スルタミシリントシル酸塩水和物 | 100mg1g | 内服 | SBTPC |
| 注射用ピクシリン0.25g | アンプシリンナトリウム | 250mg1瓶 | 注射 | ABPC |
| 注射用ピクシリン0.5g | アンプシリンナトリウム | 500mg1瓶 | 注射 | ABPC |
| 注射用ピクシリン1.0g | アンプシリンナトリウム | 1g1瓶 | 注射 | ABPC |
| 注射用ペニシリンGカリウム100万単位 | ベンジルペニシリンカリウム | 100万単位1瓶 | 注射 | PCG |

カルバペネム系

| 製品名 | 一般名 | 規格単位 | 剤型 | 略号 |
|-----------------------|--------------|---------|----|---------|
| イミペネム・シラスタチン点滴用0.5g | イミペネム・シラスタチン | 500mg1瓶 | 注射 | IPM/CS |
| オラペネム小児用細粒10% | デピペネムピボキシル | 100mg1g | 内服 | TBPM-PI |
| カルベニン点滴用0.5g | パニペネム・ベタミプロン | 500mg1瓶 | 注射 | PAPM/BP |
| 疾病限定 フィニバックス点滴静注用0.5g | ドリペネム水和物 | 500mg1瓶 | 注射 | DRPM |
| メロペネム点滴静注用0.5g | メロペネム水和物 | 500mg1瓶 | 注射 | MEPM |

ペネム系

| 製品名 | 一般名 | 規格単位 | 剤型 | 略号 |
|-----|-----|------|----|----|
| | | | | |

モノバクタム系

| 製品名 | 一般名 | 規格単位 | 剤型 | 略号 |
|------------|---------|------|----|-----|
| アザクタム注射用1g | アズトレオナム | 1g1瓶 | 注射 | AZT |

当院採用抗菌薬一覧

アミノグリコシド系

| | 製品名 | 一般名 | 規格単位 | 剤型 | 略号 |
|------|------------------|------------|---------|----|-----|
| | アマカシン硫酸塩100mg | アマカシン硫酸塩 | 100mg1管 | 注射 | AMK |
| | アマカシン硫酸塩200mg | アマカシン硫酸塩 | 200mg1管 | 注射 | AMK |
| 要時購入 | ゲンタシン注10 | ゲンタマイシン硫酸塩 | 10mg1管 | 注射 | GM |
| | ゲンタマイシン硫酸塩液40mg | ゲンタマイシン硫酸塩 | 40mg1管 | 注射 | GM |
| | ゲンタマイシン硫酸塩液60mg | ゲンタマイシン硫酸塩 | 60mg1管 | 注射 | GM |
| | ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1% | ゲンタマイシン硫酸塩 | 10g1本 | 外用 | GM |

| | 製品名 | 一般名 | 規格単位 | 剤型 | 略号 |
|--|---------------|--------------------|---------------------|----|-------|
| | バクトロバン鼻腔用軟膏 | ムピロシムカルシウム水和物 | 2%3g1本 | 外用 | |
| | ソフラチュール | フラジオマイシン硫酸塩 | (10.8mg)10cm×10cm1枚 | 外用 | FRM |
| | 眼・耳科用リンデロンA軟膏 | フラジオマイシン・リン酸ベタメタゾン | 5g1本 | 外用 | FRM混合 |
| | 眼・耳科用リンデロンA液 | フラジオマイシン・リン酸ベタメタゾン | 5mL1瓶 | 外用 | FRM混合 |

マクロライド系

| | 製品名 | 一般名 | 規格単位 | 剤型 | 略号 |
|--|-------------------|------------------|---------|----|-----|
| | エリスロシン点滴静注射用 | エリスロマイシンラクトビオン酸塩 | 500mg1瓶 | 注射 | EM |
| | エリスロシンドライシロップW20% | エリスロマイシンコハク酸エステル | 200mg1g | 内服 | EM |
| | クラリスロマイシンDS10% | クラリスロマイシン | 100mg1g | 内服 | CAM |
| | クラリスロマイシン錠200 | クラリスロマイシン | 200mg1錠 | 内服 | CAM |
| | ジスロマック点滴静注用500mg | アジスロマイシン | 500mg1瓶 | 注射 | AZM |
| | ジスロマック錠250mg | アジスロマイシン | 250mg1錠 | 内服 | AZM |
| | アジスロマイシン小児用細粒10% | アジスロマイシン | 100mg1g | 内服 | AZM |

リンコマイシン系

| | 製品名 | 一般名 | 規格単位 | 剤型 | 略号 |
|--|-------------------------|-----------------|------------|----|------|
| | クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg | クリンダマイシンリン酸エステル | 300mg1管 | 注射 | CLDM |
| | クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg | クリンダマイシンリン酸エステル | 600mg1管 | 注射 | CLDM |
| | ダラシンカプセル | クリンダマイシン塩酸塩 | 150mg1カプセル | 内服 | CLDM |
| | ダラシンTゲル1% | クリンダマイシン塩酸塩 | 1%10g1本 | 外用 | CLDM |

当院採用抗菌薬一覧

クロラムフェニコール系

| | 製品名 | 一般名 | 規格単位 | 剤型 | 略号 |
|-----|---------------------|--------------------------|------------|----|--------|
| | クロマイ-P軟膏 | クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤 | 25g1本 | 外用 | CP/FRM |
| | クロマイ膠錠 | クロラムフェニコール | 100mg1錠 | 外用 | CP |
| 要予約 | クロロマイセチンサクシネート静注用1g | クロラムフェニコールホクハク酸エステルナトリウム | 1g1瓶(溶解液付) | 注射 | CP |

ホスホマイシン系

| | 製品名 | 一般名 | 規格単位 | 剤型 | 略号 |
|--|----------------|--------------|---------|----|-----|
| | ホスホマイシンナトリウム2g | ホスホマイシンナトリウム | 2g1瓶 | 注射 | FOM |
| | ホスミンドライシロップ400 | ホスホマイシンカルシウム | 400mg1g | 内服 | FOM |
| | ホスミン錠500 | ホスホマイシンカルシウム | 500mg1錠 | 内服 | FOM |

テトラサイクリン系

| | 製品名 | 一般名 | 規格単位 | 剤型 | 略号 |
|--|-----------------|----------------|------------|----|------|
| | ビブラマイシン錠100mg | ドキシサイクリン塩酸塩水和物 | 100mg1錠 | 内服 | DOXY |
| | ミノマイシンカプセル100mg | ミノサイクリン塩酸塩 | 100mg1カプセル | 内服 | MINO |
| | 塩酸ミノサイクリン点滴静注用 | ミノサイクリン塩酸塩 | 100mg1瓶 | 注射 | MINO |

グリシルサイクリン系

| | 製品名 | 一般名 | 規格単位 | 剤型 | 略号 |
|-----|----------------|---------|---------|----|-----|
| 要承認 | タイガシル点滴静注用50mg | チゲサイクリン | 50mg1g瓶 | 注射 | TGC |

抗結核薬

| | 製品名 | 一般名 | 規格単位 | 剤型 | 略号 |
|--|------------------|--------------|------------|----|-----|
| | イソコチン錠100mg | イソニアジド | 100mg1錠 | 内服 | INH |
| | エプトール錠250mg | エタンブトール塩酸塩 | 250mg1錠 | 内服 | EB |
| | カナマイシンカプセル250mg | カナマイシン-硫酸塩 | 250mg1カプセル | 内服 | KM |
| | リファジンカプセル | リファンピシン | 150mg1カプセル | 内服 | RFP |
| | 硫酸ストレプトマイシン注射用1g | ストレプトマイシン硫酸塩 | 1g1瓶 | 注射 | SM |

抗MRSA薬

| | 製品名 | 一般名 | 規格単位 | 剤型 | 略号 |
|------|-------------------|------------|--------------|----|------|
| 要時購入 | アルベカシン硫酸塩注射液100mg | アルベカシン硫酸塩 | 100mg2mL1管 | 注射 | ABK |
| 要承認 | キュビシン静注用350mg | ダブトマイシン | 350mg1瓶 | 注射 | DAP |
| | テイコブラニン点滴静注用200mg | テイコブラニン | 200mg1瓶 | 注射 | TEIC |
| | 塩酸バンコマイシン散0.5g | バンコマイシン塩酸塩 | 500mg1瓶 | 内服 | VCM |
| 要承認 | バンコマイシン点滴静注用0.5g | バンコマイシン塩酸塩 | 0.5g1瓶 | 注射 | VCM |
| | リネゾリド注射液600mg | リネゾリド | 600mg300mL1袋 | 注射 | LZD |

当院採用抗菌薬一覧

ニューキノロン系

| 製品名 | 一般名 | 規格単位 | 剤型 | 略号 |
|----------------------|------------------|----------------|----|------|
| アベロックス錠400mg | モキシフロキサシン塩酸塩 | 400mg1錠 | 内服 | MFLX |
| オゼックス点眼液 | トスフロキサシントシル酸塩水和物 | 0.3%5mL1瓶 | 外用 | TFLX |
| オゼックス細粒小児用15% | トスフロキサシントシル酸塩水和物 | 150mg1g | 内服 | TFLX |
| クラビット点眼液0.5% | レボフロキサシン | 0.5%5mL1瓶 | 外用 | LVFX |
| クラビット点眼液1.5% | レボフロキサシン | 1.5%5mL1瓶 | 外用 | LVFX |
| グレースビット錠50mg | シタフロキサシン水和物 | 50mg1錠 | 内服 | STFX |
| ジェニナック錠200mg | メシル酸ガレノキサシン水和物 | 200mg1錠 | 内服 | GRNX |
| シブフロキサシン錠200mg | 塩酸シブフロキサシン | 200mg1錠 | 内服 | CPFX |
| タリビット眼軟膏 | オフロキサシン | 0.3%3.5g1瓶 | 外用 | OFLX |
| タリビット耳科用液 | オフロキサシン | 0.3%5mL1瓶 | 外用 | OFLX |
| レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg | レボフロキサシン | 500mg100mL1キット | 注射 | LVFX |
| レボフロキサシン内用液25mg/mL | レボフロキサシン | 250mg10mL1包 | 内服 | LVFX |
| レボフロキサシン錠250mg | レボフロキサシン | 250mg1錠 | 内服 | LVFX |

配合変化を起こしやすい主な酸性注射剤、アルカリ注射剤

岡山医療センター 薬剤部

令和3年5月現在

| 液性 | 区分 | 商品名 | pH | | |
|----------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|----------------|-----------|
| 酸性 注射液 | pH3.0 以下 | ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg(ミノイシ) | 2.0~3.5 | | |
| | | シスプラチン注 10mg | 2.0~5.5 | | |
| | | モルヒネ塩酸塩注射液10mg、50mg、200mg | 2.5~5.0 | | |
| | | プロムヘキシシン注射液4mg | 2.2~3.2 | | |
| | | ノルアドリナリン注1mg | 2.3~5.0 | | |
| | | ボスミン注1mg | 2.3~5.0 | | |
| | | エピルピシン塩酸塩注射用 | 2.5~3.5 | | |
| | | セファランチン注10mg | 2.5~3.5 | | |
| | | ドパストン静注25mg | 2.5~4.5 | | |
| | | プリンペラン注射液10mg | 2.5~4.5 | | |
| | | 点滴静注用バンコマイシン0.5 | 2.5~4.5 | | |
| | | アトニン-O 1単位, 5単位 | 2.5~4.5 | | |
| | | ドブタミン塩酸塩点滴静注100mg(ドブトレックス) | 2.5~3.5 | | |
| | | インデラル注射液2mg | 2.8~3.5 | | |
| | | ミダゾラム注10mg(ドルミカム) | 2.8~3.8 | | |
| | | ジェブタナ点滴静注60mg | 3.0~4.0 | | |
| | | ゲムシタピン注射用 200mg, 1000mg(ジエムザール) | 約3.0 | | |
| | | テモダール点滴静注用100mg | 3.0~4.5 | | |
| | | アルカリ 性注射液 | pH7.0 以上 | アレビアチン注250mg | 約12 |
| | | | | デノシン点滴静注用500mg | 10.8~11.4 |
| イソゾール注射用0.5g | 10.5~11.5 | | | | |
| アシクロビン点滴静注250mg(ソビラックス) | 10~11 | | | | |
| オメプラゾール注射用20mg | 9.5~11 | | | | |
| バクタミン注 | 9.1~9.9 | | | | |
| 10%デヒドロコール酸注 | 9.0~11.0 | | | | |
| ダントリウム静注用20mg | 9.0~10.5 | | | | |
| カンレノ酸カリウム静注用200mg(ソルダクトン) | 9.0~10.0 | | | | |
| ダイヤモンド注射用500mg | 9.0~10.0 | | | | |
| フェジン静注液40mg | 9.0~10.0 | | | | |
| フロセミド注20mg(ラシックス) | 8.5~10.0 | | | | |
| プロジフ静注液400 | 8.5~9.5 | | | | |
| ホストイン静注750mg | 8.5~9.1 | | | | |
| 5-FU注 250mg, 1000mg | 8.2~8.6 | | | | |
| ネオフィリン注250mg | 8.0~10.0 | | | | |
| スルバシリン静注用1.5g(ユナシン) | 8.0~10.0 | | | | |
| 注射用ピクシリン 250mg, 500mg, 1g | 8.0~10.0 | | | | |
| オザグレールNa注80mg | 8.8~9.8 | | | | |
| メイロン7% 20mL, 250mL | 7.6~8.6 | | | | |
| キロサイド注40mg, 200mg | 7.5~9.0 | | | | |
| キロサイドN注400mg, 1g | 8.0~9.3 | | | | |
| フェノパール注射液100mg | 7.5~9.4 | | | | |
| ファーストシン静注用1g | 7.5~9.0 | | | | |
| 注射用エラスポール100 | 7.5~8.5 | | | | |
| 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL | 7.2~7.6 | | | | |
| プロスタルモン・F注射液1000 | 7.0~9.5 | | | | |
| 注射用メソトレキセート 5mg, 50mg | 7.0~9.0 | | | | |
| メソトレキセート点滴静注液200mg, 1000mg | 8.0~9.0 | | | | |
| プロイメンド点滴静注用150mg | 7.0~9.0 | | | | |
| マブキャンパス点滴静注30mg | 7.0~7.4 | | | | |
| 静注用フローラン0.5mg, 1.5mg | 10.2~11.2 | | | | |

*詳細は添付文書参照

院内製剤一覧表

平成30年2月 現在

| クラス分類 | 特徴 | 投与経路 | 製剤名 | 規格単位 | 供用先 | 適応 | 滅菌 | 使用期限:未開封 | 保存法 |
|-------|----------|---------|----------------------------|---------------|-------------|-----------------------|-----|---------------------------|-------------|
| 1 | 外用散→注射 | 注射 | 22.5% 安息香酸ナトリウム注 | 10mL | 小児科 | 先天性高アンモニア血症 | 要滅菌 | 調製より4ヶ月 | 冷所、褐色ガラス瓶 |
| 1 | 試薬→外用液 | 散布 | 3% ルゴール液 | 100mL | 内視鏡室 | 色素内視鏡検査 | | 調製より3ヶ月 | 室温 |
| 1 | 試薬→外用液 | 塗布 | 20% 塩化アルミニウム液 | 100mL | 皮膚科 | 局所多汗症・腋臭症 | | 調製より6ヶ月 | 室温 遮光 |
| 1 | 試薬→外用液 | 塗布 | 25% トリクロロール酢酸 | 5mL | 耳鼻咽喉科 | 苔癬性疾患、アレルギ一性鼻炎 | | 調製より3ヶ月 | 気密容器 冷暗所 |
| 1 | 試薬→外用液 | 塗布 | DPCP液 | | 皮膚科 | 円形脱毛症 | | 調製より2ヶ月 | 冷所保存 |
| 1 | 試薬→外用液 | 塗布 | ヨモギローション | 450mL | 皮膚科 | かゆみ止め | | 調製より3ヶ月 | 室温 火気厳禁 |
| 1 | 試薬→外用液 | 塗布 | 安息香酸ベンジルエタノール | 500mL | 皮膚科 | 疥癬・しらみ | | 用時調製 | 室温 |
| 2 | 試薬→注射 | 注射 | ポリドカノール注射液(1.5, 2, 3%) | 10mL | 心臓血管外科 | 下肢静脈瘤に対する硬化療法 | 要滅菌 | 調製より1年 | 冷所 |
| 2 | 試薬→注射 | 注射 | 滅菌 1.5%コンゴレッド注 (コンゴレッド注) | 100mL | 皮膚科 | アミロイド症の診断 | 要滅菌 | 調製より3ヶ月 | 室温 |
| 2 | 試薬→注射 | 注射 | 滅菌 Cu-EDTA注射液 | 10mL | 皮膚科 | メンケスキーンヘアーに対する銅補充 | 要滅菌 | 調製より3ヶ月 | 冷所 |
| 1 | 試薬→注射 | 皮下注入 | メチレンブルー注 2%5mL | 5mL | OP室 | 組織染色 | 要滅菌 | 調製より3ヶ月 | 室温 |
| 1 | 試薬→外用液 | 粘膜下注入 | 2% トルイジンブルー液 | 60mL | 内視鏡室 | 食道内視鏡検査 | | | 室温 遮光 |
| 1 | 試薬→点眼 | 点眼 | 1% ローズベンガル点眼液 | 3mL | 眼科 | 角膜染色(角膜上皮欠損部を診る) | 要滅菌 | 調製より3ヶ月 | 室温 |
| 1 | 試薬→軟膏 | 塗布 | 安息香酸ベンジル・オイラックスクリーム | 200g | 皮膚科 | 疥癬・しらみ | | 用時調製 | 室温 |
| 1 | 試薬→軟膏 | 粘膜塗布 | モーズペースト | 50g | 皮膚科 | 癌の皮膚転移病巣の硬化療法 | | 用時調製 | 室温 |
| 1 | 外用液剤 | 消毒 | 0.1%リファンピシジン液 | 100mL | 心臓血管外科 | 人工血管感染防止 | 要滅菌 | 用時調整 | 冷所 |
| 2 | 外用薬→注射 | 声帯粘膜下注射 | フィブラスト注入 (処方箋で払出) | | 耳鼻咽喉科 | 声帯萎縮症による嚔声 | | | 冷所保存 |
| 1 | 外用液→外用液 | 腫洗浄 | 2% 酢酸 1.5% 酢酸 | 100mL 50mL | 婦人科 内視鏡室 | トリコモナス感染症の腫洗浄・組織組織の固定 | | 調製より3か月 | 室温 |
| 2 | 外用液→点眼 | 粘膜塗布 | 1% 塩酸液 (眼科用) | 5mL | 眼科 | 角膜局所の石灰融解 | | 調製より1ヶ月 | 冷所 |
| 1 | 外用散→外用液 | 塗布 | 10% サリチル酸アルコール | 100mL | 皮膚科 | 白癬治療 | | 調製より6ヶ月 | 冷所 遮光 |
| 1 | 外用散→点眼 | 点眼 | 4% 塩酸コカイン点眼液 | 5mL | 耳鼻科 | 耳鼻科領域の麻酔 | | 用時調製 | 室温 |
| 1 | 外用散→軟膏 | 塗布 | サリチル酸ワセリン 30%、10% | 100g | 皮膚科 | 角化症の角質軟化 | | 調製より1年 | 室温 |
| 2 | 試薬(毒)→点耳 | 点耳 | 0.02% 酢酸フェニル水銀液 | 100mL | 耳鼻科 | 耳腔内カンジダ症 | | 調製より1年 | 室温 遮光 |
| 1 | 試薬→外用液 | 塗布 | 10%硝酸銀溶液 | 5mL | 耳鼻咽喉科 | 膀胱炎、尿道炎の治療、粘膜炎 | | 用時調製 | 冷暗所 |
| 1 | 試薬→外用液 | 塗布 | 滅菌 10%硝酸銀溶液 | 100mL | 小児科 新生児科 | 粘膜炎(へその雑) | 要滅菌 | 未開封時冷暗所で1ヶ月 開封後冷暗所で1週間 | 気密容器、遮光、冷暗所 |
| 2 | 試薬→外用液 | 塗布 | SADBE | | 皮膚科 | 円形脱毛症、局所免疫療法 | | 調製より2ヶ月 | 冷所 遮光 |
| 2 | 試薬→外用液 | 塗布 | 三色色素 | 5mL | 小児外科 | 火傷の殺菌消毒 | 要滅菌 | 調製より1年 | 室温 |
| 1 | 試薬→外用液 | 粘膜下注入 | ヒオクタンブール(水溶性ヒオクタンブール) | 5mL | OP室 | OP時の線引き・角膜染色 | 要滅菌 | 調製より6ヶ月 | 室温 |
| 1 | 試薬→外用液 | 粘膜下注入 | 油性ヒオクタンブール | 5mL | 形成外科 | OP時の線引き | | 調製より6ヶ月 | 室温 |
| 2 | 試薬→点眼 | 点眼 | 5% 塩酸チラミン点眼液 | 10mL | 神経内科 | Hemer症候群の診断 | | 調製より2週間 | 室温 |
| 1 | 試薬→点耳 | 点耳 | ツェンテール | 30mL | 耳鼻咽喉科 | 鼓膜麻酔剤 | | 調製より1年 | 室温 遮光 |
| 1 | 試薬→内服液 | 経口 | 内服用ルゴール液 | 100mL | 外科 | 甲状腺摘出前投与 | | 調製より3ヶ月 | 室温 |
| 2 | 試薬→注射 | 皮下注入 | 1% ヒスタミン二塩酸塩溶液(1% ヒスタミン溶液) | 5mL | 皮膚科 | ブリックテスト対照液 | | 調製より2ヶ月 | 冷暗所 |
| 2 | 注射→外用液 | 合漱 | ロイコボリンうがい液 | 500ml | 血液内科 | 口内炎の治療 | | 用時調製 | 室温 |

院内製剤一覧表

平成30年2月 現在

| クラス分類 | 特徴 | 投与経路 | 製剤名 | 規格単位 | 供用先 | 適応 | 滅菌 | 使用期限:未開封 | 保存法 |
|-------|-------------|------|-------------------------|-----------|-------|------------------------------|-----|---------------|-------------|
| 1 | II 注射→膈坐剤 | 肛門挿入 | ウリナスタチン膈坐剤 | 1個 | 婦人科 | 切迫流早産 | | 調製より6ヶ月 | 冷所 |
| 1 | II 注射→点眼 | 点眼 | 1%フルオレサイト点眼液 | 3mL | 眼科 | 角膜染色 | 要滅菌 | 調製より6ヶ月 | 室温 |
| 1 | II 注射→点眼 | 点眼 | 5%バンコマイシン点眼液 | 10mL | 眼科 | MRSA | | 調製より1ヶ月 | 冷暗所 |
| 2 | II 注射→点眼 | 点眼 | 0.04%マイトマイシン点眼液 | 5mL | 眼科 | 上皮内癌 | | 調製より1週間 | 冷暗所 |
| 2 | II 注射→点眼 | 点眼 | 0.9%食塩水点眼液 | 10mL | 眼科 | 人口涙液 | | 用時調製 | 冷所 |
| 2 | II 注射→点眼 | 点眼 | 1%5-FU点眼液 (5-FU点眼液) | 5mL | 眼科 | 眼瞼腫瘍 | | 調製より2週間 | 冷所 |
| 2 | II 注射→点眼 | 点眼 | 2%高張食塩水 | 5mL | 眼科 | 角膜上皮浮腫 | | 用時調製 | 冷所 |
| 2 | II 注射→点眼 | 点眼 | フルコナゾール点眼液(ジフルカン点眼液) | 10mL | 眼科 | 角膜真菌症 | | 調製より1週間 | 室温 |
| 1 | II 注射→軟膏 | 塗布 | 5%テラストロン軟膏 | 10g | 小児外科 | 極小陰萎 | | 用時調製(3ヶ月-6ヶ月) | 冷所 |
| 2 | II 注射→軟膏 | 塗布 | 0.5%メシル酸ガベキサート軟膏(FOY軟膏) | 100g | 皮膚科 | 人工肛門のびらん | | 調製より2週間 | 冷所、遮光 |
| 2 | II 注射→軟膏 | 塗布 | ナファモスタット軟膏0.1% | 50mg | 代謝内科 | インスリン皮下吸収障害 | | | 室温 |
| 2 | II 点眼→点眼 | 点眼 | 0.5%硫酸アトロピン点眼液 | 5mL | 眼科 | 角膜虹彩疾患、仮性近視 | | 調製より6ヶ月 | 室温 遮光 |
| 2 | II 内服錠→外用液 | 塗布 | 2%,4%重曹水 | 500mL | | 咽頭カタル、口内炎、鼻腔・膈洗浄 | | 調製より6ヶ月 | 室温 |
| 1 | II 内服錠→外用液 | 含漱 | アロプリノール含漱水 | 500mL | 血液内科 | 癌化学療法時の口内炎の治療 | 要滅菌 | 調製より10日間 | 室温 |
| 2 | II 内服錠→外用液 | 塗布 | 1%クリンダマイシン液 | 60mL | 皮膚科 | にきび治療 | | 調製より6ヶ月 | 室温 |
| 2 | II 内服錠→外用液 | 塗布 | 1%クリンダマイシンローション | 60mL | 皮膚科 | 酒さ様皮膚炎、皮膚転移部の癌性悪臭、顔面播種状粟粒性狼瘡 | | 調製より6ヶ月 | 室温 |
| 1 | II 内服錠→軟膏 | 塗布 | メトロニダゾール軟膏 | 300mg | 皮膚科 | 患者の皮膚の清拭用・洗髪 | | 用時調製 | 室温 |
| 2 | II 内服錠→軟膏 | 含漱 | メトロニダゾール含漱液 | 500mL | 歯科 | 口腔癌の異臭 | | 用時調製 | 室温 |
| 2 | III 外用液→外用液 | 消毒 | 300倍 オスバン液 | 5L | 婦人科 | 膈洗浄・外陰部の消毒 | | 請求時調製 | 室温 |
| 2 | III 外用液→外用液 | 消毒 | 50% エタノール (アルコール) | 500mL | 外科 | | | 用時調製 | 室温、遮光した気密容器 |
| 2 | III 外用散→軟膏 | 塗布 | 10% ホウ酸亜鉛華軟膏 | 100g | 整形外科 | | | | |
| 1 | III 試薬→外用液 | 塗布 | あせも水 | 60mL | 皮膚科 | あせも治療 | | 調製より12ヶ月 | 室温 |
| 2 | III 試薬→外用液 | 外用液 | KOH液 30% (30% 水酸化カリウム液) | 10mL | 皮膚科 | 角質層より白癬菌の分離 | | 開封より1ヶ月 | 室温 |
| 1 | III 試薬→内服液 | 内服 | 滅菌セレン内服液 | 2mL | 消化器科 | セレン欠乏症 | 要滅菌 | 調製より1年 | 冷所 遮光 |
| 1 | III 試薬→内服液 | 内服 | 柿の蒂煎剤 | 100mL | 呼吸器科 | 横隔膜痙攣 | | 調製より2~3日 | 室温 |
| 2 | III 注射→外用液 | 培養液 | メデイウム | 220mL | 血液内科 | 骨髄培養液 | 要滅菌 | 用時調製 | 冷所 |
| 1 | III 注射→注射 | 消毒 | 0.01% コンクノール液 | 500mL | 婦人科 | 粘膜の消毒 | | 用時調製 | 室温 |
| 1 | III 注射→注射 | 消毒 | 0.1% コンクノール液 | 500mL | カメラス | 皮膚の消毒 | | 用時調製 | 室温 |
| 1 | III 軟膏→外用液 | 消毒 | 4% カリ石けん | 500mL, 5L | 小児科病棟 | 哺乳瓶の洗浄・皮膚洗浄 | | 用時調製 | 室温 |
| 1 | III 軟膏→外用液 | 消毒 | 40% カリ石けん | 100mL | OP室 | 眼の周囲の清浄化 | | 調製より3ヶ月 | 室温 |
| II | 注射→点眼 | 点眼 | 0.1%アムビゾーム点眼 | | 眼科 | 角膜真菌症 | 要滅菌 | | 室温 |
| II | 注射→点眼 | 点眼 | 1%ブイフェンド点眼 | | 眼科 | 角膜真菌症 | | | 冷所 |
| II | | 塗布 | アズノール・キシロカイン軟膏 | | 歯科 | 口内炎の治療・治療 | | | 冷所 |

←日本病院薬剤師会製剤集 収載

←独自分類

- クラスI: 注射剤など人体への侵襲性が大きい場合。主薬として試薬等を治療・診断目的で製剤する場合
- クラスII: 承認された投与経路の変更(例: 注射→内服)。治療・診断目的ではない場合(手術時マーキング用等)。原材料とする医薬品に添加剤等を加えて打錠する場合。局方品を治療・診断目的で適用範囲外で製剤化する場合
- クラスIII: 調剤の準備行為として2以上の医薬品を混合予製する場合。(例: 軟膏の混合、散剤の希釈、消毒剤の希釈、消毒剤の希釈など)。医薬品をカプセルに充填する場合。局方品の適用範囲内での製剤化を行う場合。組織保存液。

院内製剤一覧表

平成30年2月 現在

| クラス分類 | 特徴 | 投与経路 | 製剤名 | 規格単位 | 供用先 | 適応 | 滅菌 | 使用期限:未開封 | 保存法 |
|-------|----------|---------|----------------------------|---------------|-------------|-----------------------|-----|---------------------------|-----------------|
| 1 | 外用散→注射 | 注射 | 22.5% 安息香酸ナトリウム注 | 10mL | 小児科 | 先天性高アンモニア血症 | 要滅菌 | 調製より4ヶ月 | 冷所、褐色ガラス瓶 |
| 1 | 試薬→外用液 | 散布 | 3% ルゴール液 | 100mL | 内視鏡室 | 色素内視鏡検査 | | 調製より3ヶ月 | 室温 |
| 1 | 試薬→外用液 | 塗布 | 20% 塩化アルミニウム液 | 100mL | 皮膚科 | 局所多汗症・腋臭症 | | 調製より6ヶ月 | 室温 遮光 |
| 1 | 試薬→外用液 | 塗布 | 25% トリクロロール酢酸 | 5mL | 耳鼻咽喉科 | 苔癬性疾患、アレルギ一性鼻炎 | | 調製より3ヶ月 | 気密容器 冷暗所 |
| 1 | 試薬→外用液 | 塗布 | DPCP液 | | 皮膚科 | 円形脱毛症 | | 調製より2ヶ月 | 冷所保存 |
| 1 | 試薬→外用液 | 塗布 | ヨモギローション | 450mL | 皮膚科 | かゆみ止め | | 調製より3ヶ月 | 室温 火気厳禁 |
| 1 | 試薬→外用液 | 塗布 | 安息香酸ベンジルエタノール | 500mL | 皮膚科 | 疥癬・しらみ | | 用時調製 | 室温 |
| 2 | 試薬→注射 | 注射 | ポリドカノール注射液(1.5, 2, 3%) | 10mL | 心臓血管外科 | 下肢静脈瘤に対する硬化療法 | 要滅菌 | 調製より1年 | 冷所 |
| 2 | 試薬→注射 | 注射 | 滅菌 1.5%コンゴレッド注(コンゴレッド注) | 100mL | 皮膚科 | アミロイド症の診断 | 要滅菌 | 調製より3ヶ月 | 室温 |
| 2 | 試薬→注射 | 注射 | 滅菌 Cu-EDTA注射液 | 10mL | 皮膚科 | メンケスキーンヘアーに対する銅補充 | 要滅菌 | 調製より3ヶ月 | 冷所 |
| 1 | 試薬→注射 | 皮下注入 | メチレンブルー注 2%5mL | 5mL | OP室 | 組織染色 | 要滅菌 | 調製より3ヶ月 | 室温 |
| 1 | 試薬→外用液 | 粘膜下注入 | 2% トルイジンブルー液 | 60mL | 内視鏡室 | 食道内視鏡検査 | | | 室温 遮光 |
| 1 | 試薬→点眼 | 点眼 | 1% ローズベンガル点眼液 | 3mL | 眼科 | 角膜染色(角膜上皮欠損部を診る) | 要滅菌 | 調製より3ヶ月 | 室温 |
| 1 | 試薬→軟膏 | 塗布 | 安息香酸ベンジル・オイラックスクリーム | 200g | 皮膚科 | 疥癬・しらみ | | 用時調製 | 室温 |
| 1 | 試薬→軟膏 | 粘膜塗布 | モーズペースト | 50g | 皮膚科 | 癌の皮膚転移病巣の硬化療法 | | 用時調製 | 室温 |
| 1 | 外用液剤 | 消毒 | 0.1%リファンピシジン液 | 100mL | 心臓血管外科 | 人工血管感染防止 | 要滅菌 | 用時調整 | 冷所 |
| 2 | 外用薬→注射 | 声帯粘膜下注射 | フィブラスト注入(処方箋で払出) | | 耳鼻咽喉科 | 声帯萎縮症による嚔声 | | | 冷所保存 |
| 1 | 外用液→外用液 | 腫洗浄 | 2% 酢酸 1.5% 酢酸 | 100mL 50mL | 婦人科 内視鏡室 | トリコモナス感染症の腫洗浄・組織組織の固定 | | 調製より3か月 | 室温 |
| 2 | 外用液→点眼 | 粘膜塗布 | 1% 塩酸液(眼科用) | 5mL | 眼科 | 角膜局所の石灰融解 | | 調製より1ヶ月 | 冷所 |
| 1 | 外用散→外用液 | 塗布 | 10% サリチル酸アルコール | 100mL | 皮膚科 | 白癬治療 | | 調製より6ヶ月 | 冷所 遮光 |
| 1 | 外用散→点眼 | 点眼 | 4% 塩酸コカイン点眼液 | 5mL | 耳鼻科 | 耳鼻科領域の麻酔 | | 用時調製 | 室温 |
| 1 | 外用散→軟膏 | 塗布 | サリチル酸ワセリン 30%、10% | 100g | 皮膚科 | 角化症の角質軟化 | | 調製より1年 | 室温 |
| 2 | 試薬(毒)→点耳 | 点耳 | 0.02% 酢酸フェニル水銀液 | 100mL | 耳鼻科 | 耳腔内カンジダ症 | | 調製より1年 | 室温 遮光 |
| 1 | 試薬→外用液 | 塗布 | 10%硝酸銀溶液 | 5mL | 耳鼻咽喉科 | 膀胱炎、尿道炎の治療、粘膜炎 | | 用時調製 | 冷暗所 |
| 1 | 試薬→外用液 | 塗布 | 滅菌 10%硝酸銀溶液 | 100mL | 小児科 新生児科 | 粘膜炎(へその雑) | 要滅菌 | 未開封時冷暗所で1ヶ月 開封後冷暗所で1週間 | 気密容器、遮光、 冷暗所 |
| 2 | 試薬→外用液 | 塗布 | SADBE | | 皮膚科 | 円形脱毛症、局所免疫療法 | | 調製より2ヶ月 | 冷所 遮光 |
| 2 | 試薬→外用液 | 塗布 | 三色色素 | 5mL | 小児外科 | 火傷の殺菌消毒 | 要滅菌 | 調製より1年 | 室温 |
| 1 | 試薬→外用液 | 粘膜下注入 | ヒオクタンブール(水溶性ヒオクタンブール) | 5mL | OP室 | OP時の線引き・角膜染色 | 要滅菌 | 調製より6ヶ月 | 室温 |
| 1 | 試薬→外用液 | 粘膜下注入 | 油性ヒオクタンブール | 5mL | 形成外科 | OP時の線引き | | 調製より6ヶ月 | 室温 |
| 2 | 試薬→点眼 | 点眼 | 5% 塩酸チラミン点眼液 | 10mL | 神経内科 | Hemer症候群の診断 | | 調製より2週間 | 室温 |
| 1 | 試薬→点耳 | 点耳 | ツェンテール | 30mL | 耳鼻咽喉科 | 鼓膜麻酔剤 | | 調製より1年 | 室温 遮光 |
| 1 | 試薬→内服液 | 経口 | 内服用ルゴール液 | 100mL | 外科 | 甲状腺摘出前投与 | | 調製より3ヶ月 | 室温 |
| 2 | 試薬→注射 | 皮下注入 | 1% ヒスタミン二塩酸塩溶液(1% ヒスタミン溶液) | 5mL | 皮膚科 | ブリックテスト対照液 | | 調製より2ヶ月 | 冷暗所 |
| 2 | 注射→外用液 | 合漱 | ロイコボリンうがい液 | 500ml | 血液内科 | 口内炎の治療 | | 用時調製 | 室温 |

院内製剤一覧表

平成30年2月 現在

| クラス分類 | 特徴 | 投与経路 | 製剤名 | 規格単位 | 供用先 | 適応 | 滅菌 | 使用期限:未開封 | 保存法 |
|-------|-------------|------|-------------------------|-----------|-------|------------------------------|-----|---------------|-------------|
| 1 | II 注射→膈坐剤 | 肛門挿入 | ウリナスタチン膈坐剤 | 1個 | 婦人科 | 切迫流早産 | | 調製より6ヶ月 | 冷所 |
| 1 | II 注射→点眼 | 点眼 | 1%フルオレサイト点眼液 | 3mL | 眼科 | 角膜染色 | 要滅菌 | 調製より6ヶ月 | 室温 |
| 1 | II 注射→点眼 | 点眼 | 5%バンコマイシン点眼液 | 10mL | 眼科 | MRSA | | 調製より1ヶ月 | 冷暗所 |
| 2 | II 注射→点眼 | 点眼 | 0.04%マイトマイシン点眼液 | 5mL | 眼科 | 上皮内癌 | | 調製より1週間 | 冷暗所 |
| 2 | II 注射→点眼 | 点眼 | 0.9%食塩水点眼液 | 10mL | 眼科 | 人口涙液 | | 用時調製 | 冷所 |
| 2 | II 注射→点眼 | 点眼 | 1%5-FU点眼液(5-FU点眼液) | 5mL | 眼科 | 眼瞼腫瘍 | | 調製より2週間 | 冷所 |
| 2 | II 注射→点眼 | 点眼 | 2%高張食塩水 | 5mL | 眼科 | 角膜上皮浮腫 | | 用時調製 | 冷所 |
| 2 | II 注射→点眼 | 点眼 | フルコナゾール点眼液(ジフルカン点眼液) | 10mL | 眼科 | 角膜真菌症 | | 調製より1週間 | 室温 |
| 1 | II 注射→軟膏 | 塗布 | 5%テラストロン軟膏 | 10g | 小児外科 | 極小陰萎 | | 用時調製(3ヶ月-6ヶ月) | 冷所 |
| 2 | II 注射→軟膏 | 塗布 | 0.5%メシル酸ガベキサート軟膏(FOY軟膏) | 100g | 皮膚科 | 人工肛門のびらん | | 調製より2週間 | 冷所、遮光 |
| 2 | II 注射→軟膏 | 塗布 | ナファモスタット軟膏0.1% | 50mg | 代謝内科 | インスリン皮下吸収障害 | | | 室温 |
| 2 | II 点眼→点眼 | 点眼 | 0.5%硫酸アトロピン点眼液 | 5mL | 眼科 | 角膜虹彩疾患、仮性近視 | | 調製より6ヶ月 | 室温 遮光 |
| 2 | II 内服錠→外用液 | 塗布 | 2%,4%重曹水 | 500mL | | 咽頭カタル、口内炎、鼻腔・膈洗浄 | | 調製より6ヶ月 | 室温 |
| 1 | II 内服錠→外用液 | 含漱 | アロプリノール含漱水 | 500mL | 血液内科 | 癌化学療法時の口内炎の治療 | 要滅菌 | 調製より10日間 | 室温 |
| 2 | II 内服錠→外用液 | 塗布 | 1%クリンダマイシン液 | 60mL | 皮膚科 | にきび治療 | | 調製より6ヶ月 | 室温 |
| 2 | II 内服錠→外用液 | 塗布 | 1%クリンダマイシンローション | 60mL | 皮膚科 | 酒さ様皮膚炎、皮膚転移部の癌性悪臭、顔面播種状粟粒性狼瘡 | | 調製より6ヶ月 | 室温 |
| 1 | II 内服錠→軟膏 | 塗布 | メトロニダゾール軟膏 | 300mg | 皮膚科 | 患者の皮膚の清拭用・洗髪 | | 用時調製 | 室温 |
| 2 | II 内服錠→軟膏 | 含漱 | メトロニダゾール含漱液 | 500mL | 歯科 | 口腔癌の異臭 | | 用時調製 | 室温 |
| 2 | III 外用液→外用液 | 消毒 | 300倍 オスバン液 | 5L | 婦人科 | 膈洗浄・外陰部の消毒 | | 請求時調製 | 室温 |
| 2 | III 外用液→外用液 | 消毒 | 50%エタノール(アルコール) | 500mL | 外科 | | | 用時調製 | 室温、遮光した気密容器 |
| 2 | III 外用散→軟膏 | 塗布 | 10%ホウ酸亜鉛華軟膏 | 100g | 整形外科 | | | | |
| 1 | III 試薬→外用液 | 塗布 | あせも水 | 60mL | 皮膚科 | あせも治療 | | 調製より12ヶ月 | 室温 |
| 2 | III 試薬→外用液 | 外用液 | KOH液 30% (30%水酸化カリウム液) | 10mL | 皮膚科 | 角質層より白癬菌の分離 | | 開封より1ヶ月 | 室温 |
| 1 | III 試薬→内服液 | 内服 | 滅菌セレン内服液 | 2mL | 消化器科 | セレン欠乏症 | 要滅菌 | 調製より1年 | 冷所 遮光 |
| 1 | III 試薬→内服液 | 内服 | 柿の蒂煎剤 | 100mL | 呼吸器科 | 横隔膜痙攣 | | 調製より2~3日 | 室温 |
| 2 | III 注射→外用液 | 培養液 | メデイウム | 220mL | 血液内科 | 骨髄培養液 | 要滅菌 | 用時調製 | 冷所 |
| 1 | III 注射→注射 | 消毒 | 0.01%コンクノール液 | 500mL | 婦人科 | 粘膜の消毒 | | 用時調製 | 室温 |
| 1 | III 注射→注射 | 消毒 | 0.1%コンクノール液 | 500mL | カメラ室 | 皮膚の消毒 | | 用時調製 | 室温 |
| 1 | III 軟膏→外用液 | 消毒 | 4%カリ石けん | 500mL, 5L | 小児科病棟 | 哺乳瓶の洗浄・皮膚洗浄 | | 用時調製 | 室温 |
| 1 | III 軟膏→外用液 | 消毒 | 40%カリ石けん | 100mL | OP室 | 眼の周囲の清浄化 | | 調製より3ヶ月 | 室温 |
| II | 注射→点眼 | 点眼 | 0.1%アムビゾーム点眼 | | 眼科 | 眼膜真菌症 | 要滅菌 | | 室温 |
| II | 注射→点眼 | 点眼 | 1%ブイフェンド点眼 | | 眼科 | 角膜真菌症 | | | 冷所 |
| II | 塗布 | 塗布 | アズノール・キシロカイン軟膏 | | 歯科 | 口内炎の治療・治療 | | | 冷所 |

←日本病院薬剤師会製剤集 収載

←独自分類

- クラスI: 注射剤など人体への侵襲性が大きい場合。主薬として試薬等を治療・診断目的で製剤する場合
- クラスII: 承認された投与経路の変更(例: 注射→内服)。治療・診断目的ではない場合(手術時マーキング用等)。原材料とする医薬品に添加剤等を加えて打錠する場合。局方品を治療・診断目的で適用範囲外で製剤化する場合
- クラスIII: 調剤の準備行為として2以上の医薬品を混合予製する場合。(例: 軟膏の混合、散剤の希釈、消毒剤の希釈、消毒剤の希釈など)。医薬品をカプセルに充填する場合。局方品の適用範囲内での製剤化を行う場合。組織保存液。

付録：「今日の治療薬」未収載品

| 薬剤名 | 規格 | 用法・用量 | 備考 |
|--|-------------------------------|---|--|
| ●安息香酸ナトリウム原末「マルイシ」 防腐剤 マルイシ | 500g | | 保存・防腐。殺菌の目的で調剤に用いる。 |
| ●グリセリンBC液「ヨシダ」 | 250mL | 浣腸液の調剤に用いる。また、溶剤、軟膏基剤、湿潤・粘滑剤として調剤に用いる | 浣腸液の調剤に用いる。また、溶剤、軟膏基剤、湿潤・粘滑剤として調剤に用いる |
| ●乾燥ガスエそ抗毒素“化血研” ガスエそウマ抗毒素 | 各5,000 単位入1 瓶(溶解 液付) | 【用法】治療：なるべく早期に20～40mLを患部周辺を避けて筋注または静注。あるいは生理食塩液等で希釈して点滴静注。症状が軽減しないときは3～4時間ごとに10mLずつ追加使用。予防：なるべく早期に10～20mLを筋注または静注。約2週間予防効果を持続 | 【効能】ガスエその治療・予防。 |
| ●診断用アレルギースクラッチエキス「トリイ」 Allergen ext アレルギーエキス 鳥居 | 1mL1瓶 | 【用法】[エキス] 0.02mL、皮内注[スクラッチエキス] 乱刺または切皮法により皮膚面に出血しない程度に傷をつけ、1滴を滴下 | 【効能】アレルギー性疾患のアレルゲンの確認。 |
| ●ジアグノグリーン注 Diagnogreen インドシアニングリーン 第一三共 | 25mg1瓶 (溶解液 付) | 【用法】血漿消失率および血中停滞率測定：0.5mg/kgを注射用水で5mg/mLに希釈し、肘静脈より30秒以内に症状に注意しながら徐々に静注。肝血流量測定：25mgをできるだけ少量の注射用水に溶かした後、生理食塩液で2.5～5mg/mLの濃度に希釈し、3mgに相当する前記溶液を静注。その後引き続き0.27～0.49mg/分の割合で50分間採血が終るまで一定速度で点滴静注。循環機能検査：目的に応じて心腔内より末梢静脈に至る種々の血管部位に通常前腕静脈から注入。成人1回5～10mg(1～2mL)。小児は体重により減量 | 【効能】肝機能検査(血漿消失率・血中停滞率及び肝血流量測定)／肝疾患の診断・予後治療の判定。循環機能検査(心拍出量・平均循環時間又は異常血流量の測定)／心臓血管系疾患の診断。【禁忌】(1)本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者(2)ヨード過敏症の既往歴のある患者[本剤はヨウ素を含有しているため、ヨード過敏症を起こすおそれがある] |
| ●尿外分泌機能検査用PFD内服液 PFD ベンチロミド サンノーバ・エーザイ | 5%10mL1 管 | 【用法】早朝空腹時に、採尿後1回1瓶を200mL以上の水とともに服用。利尿をはかる目的で服用から約1時間後に最低約200mLの水を飲用させるが、それ以後については水分を自由にとらせる。検査開始より、3時間以上経過した食事は自由。尿は服用から6時間までの全尿を採尿 | 【効能】尿外分泌機能検査。【禁忌】(1)腎機能が高度に低下している患者[一定時間内の尿中排泄率で評価するため](2)急性膀胱炎の急性期[庇護療法が最優先され、本検査の対象でない](3)急性肝炎の急性期[庇護療法が最優先され、本検査の対象でない] |
| ●チンク油 Zinc Oxide Oil チンク油 日興製薬・丸石、エビス、健栄 | 10g | 【用法】症状により1日1～数回、直接患部に塗布 | 【効能】次の皮膚疾患の収れん・消炎・保護・緩和な防腐／小範囲の擦傷、小範囲の第一度熱傷、小範囲の湿疹・皮膚炎。【禁忌】重度または広範囲の熱傷[酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遷延させることがある] |

付録：「今日の治療薬」未収載品

| 薬剤名 | 規格 | 用法・用量 | 備考 |
|---|-------------|---|--|
| ●テクネシチ注-10M | | <p>1. 脳シンチグラフィ 通常, 成人には74~740MBqを静注し, 静注後10~30分までに(やむを得ず経口投与の場合は1~2時間後に)被検部のシンチグラムを得る。投与量は, 年齢, 体重により適宜増減する。</p> <p>2. 甲状腺シンチグラフィ/甲状腺摂取率測定 通常, 成人には74~370MBqを静注し, 静注後被検部のシンチグラムを得る。同時に甲状腺摂取率を測定する場合には, 投与量のカウントと被検部のカウントの比から甲状腺摂取率を測定する。また, 7.4~74MBqを静注することにより, 甲状腺摂取率のみを測定することもできる。投与量は, 年齢, 体重により適宜増減する。</p> <p>3. 唾液腺シンチグラフィ/RIシアログラフィ 通常, 成人には185~555MBqを静注し, 静注後被検部のシンチグラムを得る。必要に応じ, 唾液分泌刺激物による負荷を行い, 負荷後のシンチグラムを得る。また, 時間放射能曲線を作成することにより, RIシアログラムを得ることもできる。投与量は, 年齢, 体重により適宜増減する。</p> <p>4. 異所性胃粘膜シンチグラフィ 通常, 成人には185~370MBqを静注し, 静注後被検部のシンチグラムを得る。投与量は, 年齢, 体重により適宜増減する。</p> | <p>【効能または効果】 脳腫瘍及び脳血管障害の診断 甲状腺疾患の診断 唾液腺疾患の診断 異所性胃粘膜疾患の診断</p> |
| ●トレランG75 Trelan G デンブ部分加水分解物 味の素・味の素ファルマ | 225mL1 瓶 | 【用法】成人1回50g(G50:1瓶)、75g(G75:1瓶)、または100g(G50:2瓶)経口投与。小児1.75g/kg(G50またはG75:5.25mL)経口投与 | 【効能】糖尿病診断時の糖負荷試験。 |
| ●ブドウ酒 Wine 中北薬品 | 500mL | 【用法】通常、成人1回1食匙(15mL)又は1酒杯(60mL)を経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。また、リモナー剤や滴剤の佐薬にも用いる。 | 【効能】食欲増進、強壯、興奮 下痢 不眠症 無塩食事療法 |
| ●フェノール・亜鉛華リニメント (カチリ) Phenol and zinc oxide liniment フェノール・亜鉛華リニメント 日興製薬・丸石,エビス | 10g | 【用法】1日1~数回、適量を患部に塗布。症状により適宜増減 | 【効能】皮膚そう痒症、汗疹、蕁麻疹、小児ストロフルス、虫さされ。【禁忌】び爛、潰瘍、結痂、損傷皮膚および粘膜 |
| ●フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」 フェニルアラニン除去ミルク 雪印・ビーンスターク | 1g | 溶解濃度が15~20(w/v%)になるように温湯(70~80℃)に溶解し, よく攪拌後経口投与する。 血中フェニルアラニン濃度を定期的に測定しながら, 本剤の投与量を定める。 投与量の目安は, 乳児期:60~100g/日, 幼児期前半(1~2歳):100~120g/日, 幼児期後半(3~5歳):120~150g/日, 学童期前半(6~9歳):150~200g/日, 学童期後半及びそれ以後:200~250g/日とするが, 医師の指示により適宜増減する | 【効能】フェニルケトン尿症。【禁忌】フェニルケトン尿症以外の患者[フェニルアラニンの不足を生じる可能性がある] |

